


THEORI-
CAE NOVAE PLANE-
TARVM GEORGII PVR-
bachij foeliter incipiunt.

FIGVRA NOVE M SPHAERA-
rum & elementorum ordinem designans.

A. Terra.
B. Aqua
C. Aer
D. Ignis.
E. Luna
F. Mercurius
G. Venus
H. Sol
I. Mars
K. Iuppiter.
L. Saturnus
M. firmamentū
N. zodiacus
zone sphaerae



PARISIIS.

Apud Christianum Wechelū sub scuto Basiliensi in
uico Iacobæo: & sub Pegaso in uico Bellouacensi.

An. M. D. XLIII.

THEORY


OF THE NEW PLAN

OF THE GEOMETRICAL

FIGURES

FIGURA NOVA

OF THE GEOMETRICAL



A. T. T. A.
B. A. P. A.
C. A. T.
D. I. G. N. A.
E. L. I. G. N. A.
F. I. G. N. A.
G. E. O. M. E. T. R. I. C. A.
H. I. S. T. O. R. I. A.
I. N. S. T. R. U. C. T. I. O.
K. I. N. D. E. R. T. I. C. A.
L. I. B. E. R. A.
M. A. G. I. S. T. R. A.
N. O. T. I. A.
O. P. E. R. A.
P. R. I. N. C. I. P. I. A.
Q. U. E. S. T. I. O. N. E. S.
R. E. S. P. O. N. S. A.
S. E. N. T. E. N. T. I. A.
T. A. B. U. L. A.
T. E. X. T. U. S.
U. N. D. E. R. L. I. N. E.
V. A. R. I. A. N. T. I. A.
X. P. O. N. E. N. T. I. A.
Y. N. D. I. C. A.
Z. E. P. H. Y. R. A.

P. A. R. I. S. 1713.

Agnes Christy
also known as the
An. M. D. XLIII.

Theoricæ no-

VAE PLANETARVM

GEORGII PURBACHII FOL-
liater incipiunt.

DE SOLE.

PRIMA PARS DESCRIBIT OR-
bes & horum centra.



SOL habet tres orbes à se inulcem omni-
quaque diuisos atq; sibi contiguos. Quo-
rum supremus secundum superficiem cō-
uexam est mundo concentricus, secundum
concauam autem eccentricus. Infimus ue-
rò secundum concauam concentricus, sed secundum conue-
xam eccentricus. Tertius autem in horum medio locatus
tam secundum superficiem suam conuexam, quam conca-
uam est mundo eccentricus. Dicitur autem mundo con-
centricus orbis, cuius centrum est centrum mundi. Eccen-
tricus uerò cuius centrum est aliud à centro mundi.


Duo itaque primi sunt eccentrici secundum quid, &
uocantur orbes augem solis deferentes. Ad motum enim
eorum aux solis uariatur. Tertius uerò est eccentricus
simpliciter & uocatur orbis augem solis deferens. Ad mo-
tum enim eius, corpus solare infixum sibi mouetur. Hi

A ij

tres or-

tres orbes duo centra tenent. Nam superficies conuexa
 supremi & concava infimi idem centrum habent, quod
 est mundi centrum. Vnde tota sphaera solis, sicut & alte-
 rius cuiuscunque planetae tota sphaera concentrica mundo
 dicitur esse. Sed superficies concava supremi atque conue-
 xa infimi una cum utriusque superficiebus medij, unum
 aliud, quod centrum eccentrici dicitur, habent.

THEORICA TRIUM OR-
 bium Solis.



Scholia.

Duo orbes diffformes. C. & E.

Medius ad cuius motū sol zodiacū in anno pertrāsīt D.

Centrum mundi B.

Centrum eccentrici A.

Extima arcuferētia eclipticam representat penes quā inferiorum sphaerarum motus metimur.

SECUNDA PARS DE PERIODIS
horum trium orbium.

Textus. I.

DE PERIODICO MOTV DE-
ferentium augem.

Mouentur autem orbes deferentes augem solis, motibus propriis proportionalibus, ita quod semper strictior pars superioris sit supra latiore inferioris, & aequè cito arcuancunt secundum mutationem motus octauæ sphaeræ, de quo posterius dicendum erit. Poli tamen huius motus sunt eclipticæ octauæ sphaeræ. Aux enim eccentrici solem deferentis in superficie eiusdem eclipticæ continuè reuoluitur.

DE MOTV PERIODICO OR-
bis eccentrici qui defert corpus solare. II.

SED orbis solare corpus deferens motu proprio super suo centro scilicet eccentrici, regulariter secundū successione signorum quotidie. 59. minutis & octo secundis fere de partibus arcuferentiae per centrum corporis solaris una reuolutione completa descriptæ mouetur. Cuius motus poli à polis priorum orbium distant,

A iij


& sunt

¶ sunt termini axis illius orbis, scilicet lineæ euntis per centrum eccentrici axi orbium augem deferentium æquidistantis. Ex his apparet quod propter motum orbium augem deferentium, quem habent uirtute motus octauæ sphaeræ, axis orbis solis deferentis cum centro circuli eccentrici atque polis eiusdem arcu axem orbium augem deferentium, paruorum circulorum circunferentias describant secundum eccentricitatis quantitatem.

Theoria

7

SOLIS.
THEORICA AXIVM
ET POLORVM.



Axis deferentium augem solis, qui & axis eclipticæ
octauæ sphaeræ pars est G.B.H.

Axis eccentrici priori æquidistans .E.A.F.

Eccentricitas solis.B.A.

Poli deferentium augem.G.H.

Poli eccentrici E. & F.

A ilij

Semiār.

THEORICA


Semicirculi quos poli eccentrici raptu motus deferentium augem. E.K. & F.H.I.

Semicirculus quem eodem raptu centrum eccentrici circa centrum mundi describit. A.L.


Textus.

Cum autem centrum solare ad motum orbis ipsum deferentis regulariter super centro eccentrici moveatur, necesse erit ut super quocunque puncto alio irregulariter moveatur. Quare sol super centro mundi in temporibus equalibus inaequales angulos, & de circumferentia zodiaci inaequales arcus describit.

Scho-



Axis deferentium augem. E.K. & F.H.I.
 Axis eccentrici raptu motus deferentium augem. E.K. & F.H.I.
 Eccentricus solis. A.
 Poli deferentium augem. G.H.
 Poli eccentrici. E. & F.



Scholia.

Maiores & extremus circulus. G.N.L.P. eclipticum re-
 presentat. Minor uero. H.M.K.O. eccentricum. In ipso ec-
 centrico uersus augem arcus. H.M. arcui K.O. uersus op-
 positum augis æqualis est, quibus qui in ecliptica respō-
 dent inuicem inæquales sunt, utpote. G.N. minor L.P.
 quos tamen sol æquis temporum spatiis pertransit ut il-
 los in eccentrico æquales.

TER-

TERTIA PARS IN QVA EXPO-
nit terminos seu uocabula, quorum notitia re-
quiritur ad calculandos motus.

I.

Circulus itaque *eccentricus* uel *egresse* *cuspide* aut *egredientis* *centri*, dicitur *circulus*, cuius *centrum* est aliud à *centro mundi*, ipsum tamen *ambiens*. Imaginamur autem in *sole* *eccentricum* *circulum* per *lineam* à *centro* *eccentrici* usque ad *centrum* *solare* euntem *regulariter* *motam* super *centro* *eccentrici* una *reuolutione* facta *describi*, qui semper est *pars* *superficie* *eclipticæ* *orbis* *signorum* *octauæ* *sphæræ*.

II.

Aux *solis* in *prima* *significatione* *sive* *longitudo* *longior*, est *punctus* *circunferentiæ* *eccentrici* *maximè* à *cētro* *mundi* *remotus*. Et determinatur per *lineam* à *centro* *mundi* per *centrum* *eccentrici* *utrinque* *ductam*, quæ *linea* *augis* dicitur.


III.

Oppositum *augis* *sive* *longitudo* *propior* est *punctus* *circunferentiæ* *eccentrici*, *maximè* *centro* *mundi* *propinquus*, et semper *augi* *diametraliter* *opponitur*.

IIII.

Longitudo *media* est *punctus* *circunferentiæ* *inter* *augem* et *oppositum* *augis*. Et in *sole* determinatur per *lineam*, quæ à *centro* *mundi* *exiens* *facit* *rectos* *angulos* cum *augis* *linea*. Talia duo tantum in eodem *eccentrico* *reperiuntur*.

Linea medij motus solis est linea à centro mundi ad zodiacum extenta, lineæ à centro eccentrici ad centrum solare pertractæ æquidistans. Hæ tamen duæ lineæ bis in anno sunt unâ, ut cum sol in auge eccentrici uel opposito fuerit. Sicut autem una earum super antro suo regulariter uoluitur, ita alia etiam super suo. Nam semper cum differunt, unâ cum augis lineæ æquales angulos faciunt.



Scholia.

Lineæ angis G.H.A.B.K.L.

Aux punctum H. oppositum K. longitudines medias

O. P. que in eclipsibus productis lineis descriptis sunt

solum ut aux in puncto G.


Sole constituto in puncto eccentrici M. si lineæ A. M. &

centro eccentrici ductæ ad solum æquidistant & ceteris

de ad eclipsium lineæ pertractantur, ex erit lineæ medij

motus solum in puncto figuræ lineæ D. N.

THEORICA LINEAE ET ARCVS

medij motus augis & argumenti.

Scholia.

Linea augis. G.H.A.B.K.L.

Aux punctum H. oppositum K longitudines medie
O.P, quæ in ecliptica productis lineis designari similiter
solent ut aux in puncto G.

Sole constituto in puncto eccentrici M. si lineæ A. M à
centro eccentrici ductæ ad solem, æquidistans à cetro mū-
di ad eclipticam linea protrahatur, ea erit linea medij
motus solis, ut in presenti figura linea B.N.

VI.

Textus.

VI.

Medius motus solis est arcus zodiaci ab ariete incipiens secundum signorum successione[m] usque ad lineam medij motus computatus.

VII.

Aux solis in secunda significatione est arcus zodiaci ab ariete secundum successione[m] signorum usque ad augis lineam.

VIII.

Argumentum solis est arcus zodiaci inter augis lineam & lineam medij motus solis secundum signorum successione[m]. Hic semper est similis arui eccentrici inter augem eccentrici, & centrum solis secundum successione[m] eadenti. Ex illo patet ratio, quod subtracta auge solis in secunda significatione à solis motu medio, aut ab eo cum toto circulo, argumentum solis remaneat.

IX.

Linea ueri motus solis est linea à centro mundi per centrum corporis solaris ad zodiacum extenta. Quam solc in auge uel opposito existente eandem cum linea medij motus esse contingit.

X.

Verus motus solis est arcus à principio arietis usque ad ueri motus lineam. Tantum autem existente sole in auge uel opposito medius motus & uerus idem sunt. Alii nanque semper differunt.

Arcus augis quæ aux in secunda significatione dicitur A.C.

Argumentum D.H.

Linea ueri motus solis B.O.G.

Verus motus solis B.C.G.

Aequatio solis G.H. quæ sole ab auge ad oppositum soluente subtrahitur à medio motu ut uerus relinquitur. In reliqua autem medietate additur.

XI.

Aequatio solis est arcus zodiaci inter lineas medij motus & ueri cadens. Hanc nullam esse accidit, cum sol in auge uel opposito fuerit. Maior uerò, quæ potest esse sole in longitudinibus medijs constituto, contingit. In aliis autem locis secundum argumenti uariationem crescit & decrescit. Quanto nanque uicinior sol augi fuerit, uel opposito augis, tanto minor est, quanto uerò uicinior longitudinibus medijs, tantò maior. Dum argumentum minus sex signis communibus fuerit, linea medij motus lineam ueri præcedit, quare tunc æquatio subtrahitur. Sed dum maius sex signis est, fit è conuerso, quare tunc æquatio medio motui coniungitur, ut uerus motus solis exeat.

PRIMA PARS DE ORBI-
bus & centris.


Textus.

Luna habet orbes quatuor & unam sphaerulam. Pri-
mò enim habet tres orbes, sicut sol in figuratione dispo-
sitos, scilicet duos eccentricos secundum quid, qui uocantur
orbes augem eccentrici lune deferentes, & tertium ec-
centricum simpliciter in horum medio locatum, qui defe-
rens epicycli appellatur. Deinde habet orbem mundo
concentricum aggregatum ex tribus aliis ambientem, qui
deferens caput draconis dicitur. Vltimò habet sphaeru-
lā, quae uocatur epicyclus profunditati orbis tertij im-
mersam, in quo quidem epicyclo corpus lunare figitur.

Theo-

THEORICA ORBIVM ET

centrorum Lunæ.



Scholia.

Centrum ecœntriæ S.

Centrum mundi T.

Punctum diametraliter oppositū centro ecœntrici V.

Duo orbis difformes G. & H.K.

Ecœntrici deferens epicyclum F.M.

Quæ tus orbis deferens caput & caudâ draconis D.E.

B

Epicy-

Epicyclus orbiculus iuxta F. craßuiem eccētrici re-
plens, circa cuius centrum Luna intra epicycli super-
ficiem infixa defertur ut notula nigra prope F.

Textus.

SECUNDA PARS DE PERIO-
dicis motibus, axibus & polis.

I.

DE MOTV DEFERENTIVM
augem eccentrici.

Mouentur autem deferentes augem eccentrici contra
successionem signorum simul regulariter super centro
mundi ultra motum diurnum in die naturali gradibus
undecim & duodecim minutis ferè. Et axis motus istius
axem zodiaci in centro mundi intersecat, unde & poli
eius à polis zodiaci declinant, & quantitas talis deli-
nationis est quinque graduum inuariabilis semper.


II.

DE MOTV DEFEREN-
tis epicyclum.

Orbis uerò epicyclum deferens mouetur secundum
successionem signorum regulariter super centro mun-
di, ita quòd omni die naturali tali motu centrum epicy-
cli tredecim gradus & undecim minuta ferè peram-
bulet. Axis tamen huius motus per centrum huius or-
bis, quod centrum eccentrici dicitur, æquidistanter axi
augem deferentium mouetur. Vnde etiam poli motus i-
stius à polis orbium augem deferentium distabunt secū-
dum eccentricitatis quantitatem.

Theorica

THEORICA AXIVM
& polorum.



Scholia.

Semiarculi tam ex raptu polorum q̄ centri eccentrici
hic similiter describuntur, ut in sole monstratū est.

Textus.

Quinque correlariis exponit accidentia quæ comi-
tantur motū uel eccentrici uel deferentiū augē Ecc.

Ex istis sequitur primò, quòd quamuis eccentricus epicyclum deferens super axe atque polis suis moueatur, non tamen super eisdem regulariter mouetur.

Secundò quantò epicyclus Lunæ augis deferentis cū uicinior fuerit, tantò uelocius æntrum eius mouetur, & quantò uicinior augis eiusdem opposito, tantò tardius. Signatis enim aliquibus angulis æqualibus super centro mundi uersus augem & oppositum, qui uersus augem est, maiorem arcum eccentrici quam alter uersus oppositum complectitur.

Tertio centrum eccentrici Lunæ circa æntrū mundi & axis eiusdem orbis circa axem augem deferentium, & poli eiusdem circa polos illorum uoluntur regulariter, circumferentias contra successionem describendo.

Quartò aux eccentrici Lunæ similiter contra successionem signorum progrediendo regulariter mouebitur, & eclipticam præteribit. Vnde quandoque in superficie eius, quandoque uerò ab ea aut uersus austrū aut uersus aquilonem reperietur. Vnde fit ut etiam cētrum eccentrici similiter à superficie eclipticæ in partes oppositas quandoque recedat.

Quintò non semper superficies eclipticæ superficiem eccentrici per æqualia secabit. Cū enim aux eccentrici in latitudine fuerit, maior portio superficiem eccentrici uersus augem erit. Superficies nanque eccentrici per superficiē eclipticæ in diametro eclipticæ per centrum mundi transeunte secatur.

Voatur

Vocatur autem superficiei eccentrici circulus per lineam à cētro eccentrici usq; ad cētrum epicycli protensam, una reuolutione facta, descriptus. Huius circūferentiae partes aux & oppositum augis atque longitudo mediae, sicut in sole uocantur.

DE PROPORTIONE MOTV-


um & eccentrici & deferentium auge
gem eccen. Lunæ ad
motum Solis.

Dicti uerò orbes Lunæ in motu suo talem habent ad Solis motum annexionem, ut semper linea medij motus solis sit in medio inter cētrum epicycli lunæ & auge eccentrici eius, uel simul cum eis, uel in opposito amborum simul existentium. ita quòd in omni media solis & lunæ coniunctione, cētrum epicycli lunæ & linea medij motus solis & aux eccentrici lunæ sint in uno puncto zodiaci secundum longitudinem. Quare fit, ut in omnibus quadraturis mediis eorum, cētrum epicycli lunæ sit in opposito augis eccentrici sui. Et in omni oppositione media rursus in auge.

B 3

Sequitur

SEQVITVR INSTRVMENTVM
ex quo hæc motus lunæ uarietas perspicui potest.



Scholia.

Sit media coniunctio solis & lunæ sub principio
Arietis A. ubi lineæ mediorum motuū solis & lunæ in-
uicem & cum augis lineæ cōiungantur, post eandem cō-
iunctionē quinque ferme elapsis diebus lineæ medij mo-
tus lunæ quotidie. 13. gradus transcūdo ad quintū gra-
dum

dum Tauri perueniet.

Similiter linea augis eccentrici contra signorum ordinem singulo die 11. grad. peragrans ad quintum gradum Aquarii quinto die accedet. Sol autem seu linea medij motus eius quintum iam Arietis gradum occupabit, utrinque ad lineam medij motus lune, & augis eccentrici a linea sextilem aspectum habens, & in medio utriusque equaliter distans. Pari modo ab utraque earum linea medij motus solis semper æquè distat aut utrique simul iungitur.

Textus.

Vnde patet ratio, cur medio motu solis subtracto, à medio lune remaneat media eorum elongatio, & ea duplicata centrum lune proveniat. Distàtia namque lineæ medij motus lune à lineæ medij motus solis secundum successione signorum media uocatur eorum elongatio. Distàtia autem lineæ medij motus lune ab auge eccentrici secundum successione, centrum lune dicitur, uel longitudo duplex aut duplex interstitiū. Patet etiam, quòd in omni mense lunari centrum epicycli lune bis pertransit orbes augis eccentrici deferentes.

• III.

DE MOTV QVARTI ORBIS

qui defert caput & caudam draconis.

Sed orbis quartus concentricus caput draconis deferens mouetur super axe zodiaci circa centrum mundi regulariter, contra successione omni die naturali tribus minutis ferè, secū tali motu continuè aggregatum ex tribus orbibus, quos ambit, circūducens.

B iiij

Vnde

Vnde fit, ut circumferentia eccentrici continuè superficiem eclipticæ in aliis & aliis punctis eius uersus occidentem intersecet.

Sequitur etiam, ut tali motu poli augem deferentium, arcus polos zodiaci mouendo peripherias circulorum describant.


DE MOTV EPICYCLI

L V N A E.

IIII.

Epicyclus autem circa centrum suum corpus lunare sibi infixum in superiori parte contra successione, in inferiori secundum, deferendo mouetur super axe suo orthogonaliter super peripheriâ eccentrici iacente, ita quòd superficies plana circumferentiæ epicycli, quam centrum corporis lunæ motu epicycli describit, in superficie plana eccentrici maneat nusquam ab eo declinans.

Scholia



Scholia.

Zodiacus extimus circulus iuxta quem sex priorum signorum characteres figurantur.

Eccentricus epicyclum deferens H.E.K.

Epicyclus orbiculus super circumferentia eccentrica centrum habens C.B.A.G.F.D.

Ordo motus lune in ipso epicyclo circa centrum eiusdem per superiorem partem contra successione signorum

gnorum & secundum eorum ordinem per inferiorem
nempe à C. per B. A. G. F. D. ad C redeundo.

Textus.

DE IRREGVLARI MO-
tu epicycli.

Circumuoluitur tamen epicyclus taliter, ut super cē-
tro proprio atque axe irregulariter moueatur. Sed hæc
irregularitas ad uniformitatem reducitur istam, ut à pū-
cto augis epicycli mediæ, quicunque sit ille, quolibet die
naturali tredecim gradus & quatuor minuta ferè recē-
dendo regulariter elongetur.


Aux autem mediæ epicycli, est punctus circumferē-
tiæ epicycli, quem ostendit linea à puncto diametraliter
opposito centro eccentrici in circulo paruo, per centrum
epicycli ducta.

Sed aux epicycli uera, est punctus eiusdem circunfe-
rentiæ, quem linea à centro mundi per centrum epicycli
ducta indicat. Hæ duæ auges unus punctus sunt, cum
centrum epicycli in auge deferentis uel opposito fuerit.
Alibi autem ubicunque differunt.


Ex istis patet, quòd nullus idem punctus concuitta-
tis, in qua epicyclus situatur, continuè super auge epi-
cycli mediæ siue uera maneat. Nam talis punctus concu-
uitatis, qui centro epicycli existente in auge deferentis uel
opposito, super auge mediæ epicycli & uera fuerit, sem-
per (ubicunque centrum epicycli sit) per lineam ductam
à centro eccentrici per centrum epicycli determinatur.
Talis autem punctus centro epicycli alibi, quàm in auge
uel

uel opposito existente, non est super augem mediam epicycli, neque ueram, imò tam aux uera, quam media sunt tunc sub locis eiusdem concavitationis aliis. Tres namque lineæ prædicta puncta ostendentes in centro epicycli tunc sese secabunt. Erit tamen ita, ut aux uera semper, dum ab auge media differt, sit inter augem mediam, & punctum concavitationis, sub quo aux uera, dum centrum epicycli in auge deferentis uel opposito fuerit, esse solet. Quare sequitur, ut tam aux media epicycli, quam uera continuè uariantur. Inferitur ex hoc etiam, quòd reuolutio epicycli circa centrum suum, centro epicycli per superiorem eccentrici medietatem discurrente sit uelocior, per inferiorem uerò tardior.

Schema



THEORICA
SCHEMA TRIUM PVN-
CTORVM.



Scholia.

Centrum eccentrici S. mundi uerò T.

Punctum oppositum centro cœntrici in paruo cir-
culo V.

Sex situs epicycli sex albis orbiculis in cœntrico si-
gnatis per literas A.B.C.D.E.F. designantur.


Tres

Tres lineæ à centro mundi, à centro eccentrici & à puncto eidem opposito per centrum epicycli productæ in superiori parte epicycli tria puncta in præsens attentè notanda distinguunt, nèpe quæ à centro mūdi exit augem ueram epicycli iuxta punctum V, quæ à puncto opposito centro eccentrici ducitur, augem mediam signat ad M: P. uerò illud designat punctum, sub quo media & uera aux inuicē coniungūtur, scilicet centro epicycli per eccentrici augem aut eius oppositum transeunte.

Arcus epicycli mediam ac ueram augem interiacens scilicet V. M. dicitur centri æquatio, quæ prope longitudes medias maxima fit in auge eccentrici atque eius opposito nulla.

Theoria

THEORICA VELOCITATIS ET TARDITATIS MOTUS EPICYCLI.



Scholia.

Epicycli centro ab auge ecentria per unius signi interuallum recedente aux media saliat M. arcu P.M. mouetur secundum ordinem motus lune. hinc tanta portione uelocius luna quam medio argumento fertur, cum semper aequè recedat ab ipsa media auge 13. gradibus quotidie saliat.

Dum uerò epicyclus per infimā eccentrici medietatē incedit, nō secundū ordinē motus lunæ media aux mouetur, sed ad contrarias partes, adeò quòd interea dū epicyclus ex Scorpione trāsit ad Sagittariū (quod in hac figura oppositū augis est) ex M. ad P, media aux regreditur, arcū. M. P. ei distantie quā luna suo motu consequitur addens, ne c tamē singulo die maiori spatio à media auge recedit, quā dum ordo motus augis media, motus lunæ sequebatur seriem.

TEXTVS.

TERTIA PARS, EXPOSITIO

terminorum seu uocabulorum, sine quorum noticia motus non possunt calculari.

Linea itaque medij motus lunæ est, quæ à centro mundi usque ad zodiacum per centrum epicycli protrahitur.

Medius motus lunæ est arcus zodiaci ab arietis initio usque ad dictum locum.

Centrum lunæ patet ex dictis.

Linea ueri loci siue ueri motus lunæ est, quæ à centro mundi per centrum corporis lunæ ad zodiacum extenditur.

Verus motus lunæ est arcus zodiaci à principio arietis usque ad dictam lineam.

Aequatio centri est arcus epicycli, augem ipsius ueram & mediā intercidentes. Hæc nulla fit cētro epicycli in auge

auge eccentrici uel opposito existente. Maxima uero cum ipsum fuerit modicum infra longitudines medias deferentis.


Argumentum lunæ medium est arcus epicycli, ab auge epicycli media secundum motum centri corporis lunaris, usque ad idem centrum lunare computatus.

Argumentum autem uerum ab auge uera, usque ad centrum corporis lunæ protenditur. Differentia igitur inter hæc argumenta, quando differunt, est centri æquatio. Cum uero centrum epicycli lunæ minus sex signis fuerit, maius est argumentum uerum medio. Ideo æquatio centri argumento medio adiicitur. Sed cum plus sex signis fuerit, fit econuerso. Quare tunc subtrahitur ad habendum uerum argumentum.

Æquatio argumenti est arcus zodiaci lineis medij motus & ueri interiacens. Hanc nullam esse contingit, dum centrum corporis lunaris in auge uera epicycli uel opposito fuerit, ubicunque tunc sit centrum epicycli. Maxima uero, dum centrum epicycli in opposito augis eccentrici fuerit, & cum hoc luna in linea à centro mundi ad peripheriam epicycli ducta continenter, existente. Dum autem uerum argumentum est minus sex signis, linea medij motus lineam ueri præcedit in signorum successione. Ideo tunc æquatio argumenti à medio motu subtrahitur. Sed dum plus sex signis fuerit, fit econuerso. Quare tunc coniungitur, ut uerus motus cueniat.

Schema

LVNAE. 33
 SCHEMA LINEARVM MOTV-
 um & æquationum Lunæ.



Scholia.

Linea medij motus T B. quæ & ueram augem epi-
 cycli signat in puncto D.

Medius motus arcus eclipticæ A.B.

Lunæ notula F.

Lineæ ueri motus. T.F.C.

C

Veritas

Verus motus arcus eclipticæ. A.C.

Aequatio centri arcus epicycli. D.E.

Argumentū medium arcus epicycli. E.F.

Argumentum uerum D.E.F.

Aequatio argumenti arcus eclipticæ B.C.

*Epicyclo ab auge ecētrici ad eius oppositum sol-
uēte, æquatio centri ad medium argumentum, ut inueni-
atur uerum, addenda est. Sed ab opposito augis ad eā-
dem centro epicycli gradiente, uidelicet dum centrum
lunæ sex signis minus est, ut in partibus N. uel O. eadē
tunc subducitur. Ceterū æquatio argumenti à medio
motu subducitur, dum sex signis argumentum minus est:
dum uerò maius, additur: hinc demum uerus locus lunæ
elicitur.*

Textus.

DE DIVERSITATE DIAME- tri & minutis proportionalibus.

I.

*Diuersificentur tamen æquationes eorundem argu-
mentorum, centro epicycli ab auge deferentis ad oppo-
situm eunte. Continuè nanque maiorantur secūdum ac-
cessum centri epicycli ad centrum mundi. Vnde fit, ut
æquationes singulorum argumentorum, quæ contingunt
cētro epicycli in opposito augis ecētrici existente, sint
maiores singulis æquationibus argumentorum, quæ fiūt,
dum centrum epicycli in auge ecētrici fuerit, relatiuas
suis relatiuis comparando. Excessus autem harum super
illas, diuersitates diametri circuli breuīs nuncupantur.*

II.

Linea

Linea uerò à centro mundi ad augem deferentis protracta, longior est lineâ ab eodem centro ad oppositum augis extenta. Excessus autem illius super istam diuisus. 60. particulas æquales, minuta proportionalia dicitur, & duplus est ad eccentricitatem. Linea nanque medij motus lune, quæ dirigitur ad augẽ eccentrici, nullam de istis particulis extra peripheriam eccentrici tenet, sed omnes intra. Ea uerò quæ ad oppositum augis porrigitur, omnes habet extra, nullam autem intra. Sed quæ ad alia loca eccentrici protenduntur, aliquot de illis habent extra, tantoq; plures, quanto uicinius centrum epicycli fuerit augis opposito, & tantò pauciores quãtò uicinius augi.

III.

Aequationes autem argumentorum, quæ scriptæ sunt in tabulis, sunt, quæ contingunt, dum centrum epicycli in auge deferentis fuerit.

IIII.

Sed illæ (ut dictum est) minores sunt eis, quæ centro epicycli alibi constituto fiunt. Cum igitur centrum epicycli alibi constituitur (quod fit, dum centrum lune est aliquid) per centrum accipiuntur in tabula minuta proportionalia, & per argumentum uerum accipitur diuersitas diametri, quæ tota additur ad æquationem argumenti prius in tabula receptam, si minuta proportionalia. 60. fuerint. Sed si minus fuerint, non tota additur, sed aliqua eius portio talis, qualia sunt minuta proportionalia respectu. 60. & tunc proueniet æquatio argumenti uera, ad talem situm epicycli.


Scholia in figuram appositam.

Sit arcus epicycli D.F.

Argumentum 8. signorum, ex quo in auge eccentrici prodeat equatio argumenti arcus eclipticæ, B.C. 13. graduum, & in augis opposito arcus B.C. 15. gradus cōplectens. ipsarum utique equationum differentia diuersitas diametri appellata, erit 2. graduum. Cum autem equationes argumenti lune, quæ in tabulis scribuntur, omnium minimæ sint, quippe quæ in auge eccentrici fiunt, si centrum epicycli in opposito augis fuerit, ubi omnia minuta proportionalia puta 60. habet, tota diuersitas diametri equationi in tabulis repertæ addenda est, ut habeatur uera equatio. At ubi epicyclus circa mediam longitudinem constitutus, minorum proportionalium medietatem, seu 30. habuerit, dimidium diuersitatis eidem equationi adiungentes, equationem ueram conflabimus, ut in exemplo sumpto in quo erat equatio 13. graduū, & diuersitas diametri fuit. 2. graduum, quorum medietate scilicet uno gradu equationi inequæte addito, equatio uera prodibit 14. grad.

De

THEORICA MINVTORVM PROPOR-
tionalium & diuersitatis diametri Luna.



Colloanda est haec figura statim post Pag. 36.

DE DRACONE LVNAE.

Textus.

Superficies eccentrici lune, ut dictum est, propter declinationem polorum orbium augem deferentium superficiem eclipticæ super diametro mundi intersecat. Unde una eius pars uersus aquilonem, altera uersus Austrum, ab ecliptica declinabit. Illa igitur intersectio circumferentiæ eccentrici lune cum superfacie eclipticæ, in qua cum centrum epicycli fuerit, uersus aquilonem incipit ire, caput draconis nuncupatur, Cauda uero reliqua.

Mouentur autem hæ intersectiones quotidie ultra motum diurnum uersus occidentem tribus minutis ferè, uirtute motus orbis aggregatum trium aliorum orbium lune ambientis.


Medius itaque motus capitis draconis lune, est arcus zodiaci à principio arietis contra successione signorum usque ad lineam à centro mundi per sectionem capitis protractam numeratus.

Verus autem motus capitis est arcus zodiaci ab arietis initio ad iam dictam lineam secundum successione signorum computatus.

Similiter dici potest de cauda.

Ex his manifestum est, quod subtracto medio motu capitis à duodecim signis, uerus eius motus remanet. Unde commune dictum dicens, caput lune tantum medio motu ire contra firmamentum, quantum in ueritate uadat cum firmamento, ita intelligitur, medius motus capitis lune contra successione signorum in eum punctum protenditur, in quem uerus secundum successione signorum.

THEORICA
THEORICA CAPITIS ET
caudæ draconis & arcuum.



Scholia.

Ecliptica A. B.C.E.

Eccentricus seu via lunæ L.M.N.

Aequans lunæ G.H.K.

Caput draconis N.

Cauda draconis H.

Venter draconis Septentrionalis L. Austrini M.

Prim.

Principium arietis A.

Araus medij motu scapitis draconis contra signorum
seriem. A.E.

Araus ueri motus eiusdem iuxta ordinem signo-
rum A.B.C.E.

DE TRIBVS SUPERIO- RIBVS.

PRIMA PARS DE NV- mero orbium.

Textus.

Quilibet trium superiorum tres orbes habet à se
diuisos secundum imaginationem trium orbium solis. In
orbe tamē medio, qui excentricus simpliater existit, qui-
libet habet epicyclum, in quo, sicut in luna tactum est,
corpus planetae figitur.

SECUNDA PARS DE MOTI- bus periodicis, axibus, & polis.

I. De motu deferentium augem excentricā.

Orbes autem auges deferentes, uirtute motus octa-
uæ sphaerae super axe & polis eclipticae mouentur.


II. De motu deferentis epicyclum.

Sed orbis epicyclum deferens super axe suo axem
zodiaci secante secundum suæssionem signorum moue-
tur, & poli eius distant à polis zodiaci distantia non
equali.

Theo-

THEORICA ORBIVM

& antrorum trium superio-
rum & Veneris.



Scholia.

Centrum mundi D.

Eccentrici deferentis C.

Aequantis H.

Circunferentia eccentrici deferentis B.F.G.

Aequantis circunferentia K.F.L.

Epi cyclos

Epicylus in. B. circa cuius centrum planeta intra ipsum epicyclum infixus mouetur, secundum signorum consequentiam per superiorem epicycli partem, per inferiorem contra.

Textus.

CORRELARIA SEV AP-
pendias.


Quare fit, ut auges eorum eccentricorum nunquam eclipticam pertranseant, sed semper ab ea uersus aquilonem & opposita uersus austrum maneant, ita ut auges, scilicet deferentium epicyclos, similiter opposita, atque centra & poli deferentium eccentricorum, circumferentias, superficiei eclipticæ (uirtute motus octauæ sphaeræ) describant æquidistantes.

Vnde etiam in illis superficies eccentricorum à superficie eclipticæ inæqualiter secabuntur, atque maiores portiones uersus augem, minores uersus oppositum relinquantur.

D

Theorica

THEORICA AXIVM ET PO-
lorum & quæ his accidunt.



Scholia.

Axis eclipticæ & deferentium augem eccentrici
E.D.F.

Axis eccentrici M.C.N.

Polus deferentis N. minus distans ab axe eclipticæ, quam M. Polus aduersus.

M.P. & K. L. & A.B. ac N. O & C.R. circūferentis

rentiæ raptu motus deferentiũ augem descriptæ æquidistantis eclipticæ.

Textus.

DE IRREGVLARI MOTV

deferentis epicyclum.

Motus autem epicyclum deferentis super æntro & polis suis difformis est. Hæc tamen difformitas hanc regularitatis habet normam, ut æntrum epicycli super quodam pũcto in linea augis tantũ à æntro huius orbis, quantum hoc æntrum à æntro mundi distat elongato regulariter moueatur. Vnde & punctus ille æntrum æquantis diatur, & circulus super eo ad quantitatem deferētis secum in eadem superfacie imaginatus eccentricus æquans appellatur.

Necessariò igitur oppositum ei, quod in luna fiebat accidit in istis, ut scilicet æntrum epicycli quantò uianius augi deferentis fuerit, tantò tardius: quantò uerò propinquius opposito, tantò uelocius moueatur.

III.

DE MOTV PERIO-

dico epicycli.

Epicyclus uerò duos habet motus, quorum unus est in longitudinem, alter in latitudinem. De secundo dicendũ erit postea. Motus autem eius in longitudinem est, quo mouetur circa æntrum suum corpus planctæ sibi in-

D 2

fixum


infixum in parte superiori secundum successione, in inferiori e contra deferendo. Vnde per oppositum in hoc se habet epicyclo lune. Axis huius motus transversaliter super circumsferentia iacet, axi eclipticæ æquidistans quandoque, quandoque non, ut patebit.

DE IRREGVLARI MOTU epicyclorum.

Et est super antro epicycli irregularis. Hæc tamen irregularitas hanc habet regulam, ut à puncto augis epicycli mediæ, quicumque sit, corpus planeta regulariter elongetur. Similiter igitur in his sicut in luna sequi neasse est, ut continuè aux mediæ epicycli simul & uera uariantur, atque uelociorem esse motum reuolutionis epicycli super antro suo per medietatem deferentis superiorem, tardiozem autem per inferiorem.

Schema

SCHEMA TRIVM PVNCTO-
rum & irregularis motus epicycli.



Scholia.



Tres literæ V.P.M. augem mediam epicycli, augem
ueram, & punctum sub quo iunguntur notant. Sed li-
nea medie augis à centro æquantis duatur.

Epicycli lune, & suarum augium motibus perspe-
ctis, motuum epicyclorum Saturni, Iouis & Martis, ue-

locitas uel tarditas primo intuitu patebūt, ordine motus mutato, quandoquidem per supernam partē epicycli signorum consequentiam planetae superiores sequuntur.

Textus.

DE PROPORTIONE QVAM
gerit motus epicyclorum ad motum
solis, ex qua colligitur
periodicum
tempus.

Habet autem epicycli reuolutio mensuram illam, ut semel præcisè in tanto tempore, quantum est à media coniunctione Solis & istius planetae ad proximam sequentem reuoluatur, ita ut in omni coniunctione media tale centrum corporis planetae sit in auge media epicycli. Vnde & in omni oppositione tali media fiet in opposito augis epicycli.

Fit igitur, ut semper centrum corporis planetae tot gradibus & minutis distet ab auge media epicycli, quot linea medij motus solis distat à linea medij motus planetae. Ergo subtracto medio motu planetae de medio motu solis neæsse est, ut argumentum medium planetae remaneat.

2. Hinc uidetur accidere, ut quantò centrum epicycli planetae tardius arcuit, tantò epicyclus eius uelocius reuoluatur. Nam propter tarditatem talem coniunctio media motus solis cum eo citius reuertitur.

3. Medius etiam motus cuiuscunq; trium horum aggregatus

gregatus motui eius in suo epicyclo æqualis medio motui solis in gradibus & minutis existit.

TERTIA PARS, EXPOSITIO

vocabulorum quæ in tribus superiorib. &

duo. inferiorib. planetis usum habent.

Aux autem media epicycli per lineam à centro æquantis per centrum epicycli protracta ostenditur.

Sed aux uera per lineam à centro mundi per centrū epicycli. Inter has secundum longitudinem zodiaci nihil mediat, cum centrum epicycli in auge deferentis uel opposito fuerit. Maxime uerò differunt, cum fuerit prope longitudes medias deferentis, quæ per lineam à centro eccentrici deferentis super lineam augis orthogonaliter eductam determinantur.

Aux planetæ in secunda significatione est arcus zodiaci, ab ariete usque ad lineam augis.

Linea medij motus planetæ uel epicycli est, quæ à centro mundi ad zodiacum protrahitur, lineæ exeunti à centro æquantis ad centrum epicycli æquidistans.

Linea ueri motus uel epicycli est, quæ exit à centro mundi per centrum epicycli ad zodiacum.

Linea ueri loci uel motus planetæ est, quæ à centro mundi per centrum corporis planetæ ad zodiacū protrahitur.

Medius motus planetæ uel epicycli est, arcus zodiaci ab initio arietis secundum successione, usque ad lineam medij motus planetæ.


Verus autem motus epicycli usque ad lineam ueri motus epicycli. Sed uerus motus planetæ usque ad lineam ueri motus planetæ computatur.

Centrum medium planetæ est arcus zodiaci, à linea augis ad lineam medij motus epicycli.

Centrum uerum aut æquatum à linea augis usq; ad lineam ueri motus epicycli numeratur.

Æquatio centri in zodiaco, est arcus zodiaci inter lineam medij motus epicycli & lineam ueri motus eiusdem. Hæc nulla est centro epicycli in auge deferentis uel opposito existente, maxima uerò dum in longitudinib. mediis fuerit. Cum autem centrum medium minus est sex signis, ipsum maius est uero. Similiter medius motus planetæ, maior est uero motu epicycli. Quare tunc subtrahitur æquatio centri in zodiaco à centro medio, & etiam à medio motu epicycli, ut centrum uerum & uerus motus epicycli remaneat. Oppositum uerò contingit, dum centrum medium plus sex signis fuerit.

Decla-

DECLARATIO PRAECCEDEN-
tium uocabulorum & regulae practicae.

Scholia.

A. principium Arietis.

Aux in secunda significatione arcus A.B.

Cētro epicycli in F. Linea D.O. linea medij motus
planetæ & epicycli. Linea ueri motus epicycli D.F.E.

Medius motus planetæ & epicycli A.B.E.O.

Verus motus epicycli A.B.E.

Centrum medium B.E.O.


Verum B.E.

Acquatio centri in zodiaco E.O. in prima ab auge
medietate subtrahenda, in secunda uerò addenda prout
in figura

in figura liquido patet.

Textus.

Aequatio centri in epicyclo, est arcus epicycli augem mediā & ueram eius interiacens. Hæc similiter nulla est, dū centrum epicycli in auge deferentis uel opposito fuerit, maxima autem in longitudine deferētis media. Qualis uerò est proportio æquationis centri in zodiaco ad totum zodiacum, ea est æquationis centri in epicyclo ad totum epicyclum, eò quòd propter lineas æquidistantes angulus unius æquatur angulo alterius. Igitur unā eadem in tabulis accepta, habetur & reliqua.



Scholia.

Aequatio centri in epicyclo arcus epicycli P.N. similis

milis arcui Ecclipticæ N.G.

Textus.

Dum autem æquatio centri in zodiaco à centro medio minuitur, ut uerum habeatur, æquatio centri in epicyclo argumento medio pro uero habendo iungitur, & e conuerso, quando hæc adiungitur, altera subtrahitur. Alternatim enim pariter sese excedunt atque exceduntur.


Argumentum medium planetæ est arcus epicycli ab auge media secundum motum eius, ad centrum corporis planetæ numeratus.

Argumentum autem uerum ab auge uera computatur.

Æquatio argumenti est arcus zodiaci lineas ueri loci planetæ & ueri loci epicycli interiacens. Hæc sicut in luna nulla est, dum centrum corporis planetæ in auge uera epicycli uel opposito fuerit. Maxima uero dñ corpus planetæ fuerit in linea à centro mundi ad circumferentiam epicycli contingenter educta, centro epicycli in opposito augis deferentis existente. Cum uero argumentum æquatum minus est sex signis, linea ueri motus planetæ, lineam ueri motus epicycli præcedit. Ideo tunc æquatio argumenti ad uerum motum epicycli iungitur, ut uerus motus epicycli eueniat, e conuerso cōtingit, dum plus sex signis fuerit.

Consti-

TRIVM SUPERIORVM. 53
 THEORICA IN QVA OMNES
 lineæ & arcus hactenus descri-
 pti ostenduntur.



Scholia.



Vera aux epicycli O.

Aux media P.

Linea medij motus planetae & eple. D.L.

Linea veri motus epicycli D. E.R.

Linea veri motus planetae D.F.M.

Aux

Aux in secunda significatione A.N.

Medius motus planetae & epi. A.L.

Centrum medium planetae N.L.

Aequatio centri in zodia. R.L.

A medio centro hac aequatione ablata, remanet centrum uerum arcus N.R.

Medium argu. P.I.F.

Aequatio argumenti O.P. qua arg. medio addita prodibit O.P.I.F. uerū argumentum, ex quo cognoscatur argumenti aequatio, R.M. qua aequatione centri R.L. coniuncta producit arcus M.L. aequatio tertio examinata, quam à medio motu A. L. demendo, relinquitur, tandem arcus eclipticae A. M. qui est uerus motus planetae ab Ariete primi mobilis supputatus.

Textus.


Accidit autem aequationes argumenti in istis, sicut in luna propter accessum centri epicycli, ad centrum mundi diuersificari. Vnde maiores sunt aequationes singulorum argumentorum centro epicycli existente in opposito auge deferentis, quam eo existente in longitudinib. mediis eiusdem, illic etiam maiores quam eo existente in auge deferentis, relatiuas semper suis relatiuis comparando. Excessus igitur aequationum argumentorū, quae fiunt centro epicycli existente in longitudine media deferentis, super aequationes contingentes, dum in auge fuerit, diuersitates diametri longiores siue ad longitudinem longiorem appellantur. Sed excessus earum, quae fiunt centro epicycli

eli existente in opposito angis constituto super contingentes in longitudine media, diuersitates diametri propiores siue ad longitudinem propiorem nuncupantur.

Quia uerò linea à centro mundi ad augem deferētis protensa longior est, quàm linea ab eodem centro ad longitudinem mediam deferentiseducta. Ex æssus autem istius super istam in sexaginta particulas æquales diuisus, minuta proportionalia longiora siue ad longitudinem longiorem diatur. Linea itaque ueri motus epicycli, dum in auge deferentis fuerit, habet omnes eas intra deferentis peripheriam. Sed in media longitudine nullam intra, omnes tamen extra. In locis autem intermediis aliquot intra & aliquot extra, & tantò plures intra, quantò fuerit centrum epicycli deferentis augi uicinius. Similiter linea à centro mundi ad longitudinem deferentis mediā extensa longior est, quàm linea, quæ ab eodem cetro ad oppositum augis deferentis ducitur. Ex æssus autē huius super illam in sexaginta partes diuisus, minuta proportionalia ad longitudinem propiorem siue propiora uocantur. Linea itaque ueri motus epicycli dum in longitudine media fuerit, nullam earum habet extra deferentis peripheriam, sed in augis opposito omnes. In locis autem intermediis tantò plures extra, quantò centrū epicycli augis opposito fuerit propinquius.

Schema

SCHEMA MINVTORVM PRO-
portionalium & diuersitatis diametri trium
superiorum & Veneris.



Scholia.

Linea A.B. exædit lineam D. L. longitudine L.R.
huius lineæ L.R. in 60. partes æquas diuise 60.mi-
nuta proportionalia longiora præstant diuisiones.

Similiter

Similiter linea D.L. lineam D.G. excedit. lineâ L.R. cuius partes sexagesimæ propiora minuta proportionalia efficiunt.

Aequationes argumentorum in tabulis Alfonsi repertæ sunt, quæ fiunt centro epicycli in puncto L constituto. Ac ipsæ quidem mediæ sunt inter maximas quæ in opposito augis eccentrici fiunt, & minimas dum epicyc. in auge est. Vt igitur hic habentur longiora ac propiora minuta proportionalia, sic longiorem ac propiorem diuersitates diametri comperies.

Cum itaque in parte superiori deferentis scilicet in arcu L.B.E.K. centrum epic. fuerit, erunt diuersitas diametri, & minuta proportionalia longiora. Hinc iuxta minorum portionem diuersitatis diametri certa portio ab æquatione argumenti demenda est, ut pro situ epicyc. uera fiat æquatio. At dum centrum epicycli per arcum K.I.G.L. mouetur, minuta proportionalia & diuersitas diametri propiora sunt, quapropter pro minorum proportionalium ad. 60. proportionem certa diuersitatis portio (uel diuersitas integra si minuta proportionalis sexaginta fuerint) æquationi in tabulis repertæ additur, ex quibus æquatio æquata generatur.

Textus.

Aequationes autem argumentorum, quæ scribuntur in tabulis, contingunt centro epicycli in longitudine deferentis media constituto. Sed hæ ut dictum est, maiores sunt iis, quæ fiunt dum in auge fuerit, minores uerò aliis in augis opposito contingentibus.

Cum igitur centrum epicycli extra longitudinem mediam deferentis fuerit, per centrum uerum cognoscuntur minuta proportionalia, & per argumentum uerum accipitur diuersitas diametri, longior quidem, si minuta proportionalia sint longiora: propior autem, si propiora. Cuius diuersitatis pars proportionalis secundum proportionem minutorum proportionalium ad sexaginta, cum equatione argumenti in tabula reperta addenda est, uel ab ea minuenda. Addenda quidem, si diuersitas propior fuerit, minuenda uero, si longior, & proueniet equatio argumenti uera & equata ad talem situm centri epicycli.

DE VENERE.

Venus tres habet orbes cum epicyclo, quo ad situm atque motum in longitudinem, ut aliquis superiorum, dispositos. Orbes nanque augem deferentes super axe zodiaci secundum motum octauæ sphaeræ mouentur, ita tamen, ut aux eccentrici eius sub eo loco zodiaci sit semper, sub quo aux eccentrici solis. Unde habita auge solis in secunda significatione, habetur & aux Veneris eadem.

DE HARMONIA MOTVVM

Solis & Veneris.

Orbis autem epicyclum deferens, duos habet motus: Vnum, quo proædit in longitudinem uersus orientem, regulariter super centro æquantis, ut in superioribus, ita tamen,

tamen, ut in eo tempore reuolutione una centrum
epicycli faciat, quo præse orbis solem deferens unam.
Habet se nanque Venus ad solem in hoc, ut linea medi
motus eius in eo loco zodiaci secundum longitudinem,
in quo linea medi motus solis terminetur. Vnde habito
medio motu solis, habetur & medius Veneris. Semper
igitur est media eorum coniunctio.

Fit autem motus huius deferentis in longitudinem
super axe eius imaginario, cuius poli accedunt & rece-
dunt à polis zodiaci in utranque partem propter motū
altum eccentrici in latitudinem, de quo post dicendum
erit. Quare non accidit ei, quod superiorib. ut aux ec-
centrici eclipticam non transeat, uerum quandoque ad
meridiem, quandoque ad septentrionem declinat, ut pa-
tebit.

DE MOTV ET TEMPORE periodico epicycli.


Sed epicyclus eius motu duplici mouetur, scilicet in
longum & in latum. In longitudinem quidem sicut epi-
cycli superiorum. Semper tamen in decemnouem men-
sib. solarib. ferè semel reuoluitur. Vnde solem in hoc,
sicut superiores, non respiciat.

DE VOCABVLIS ARCVM

& linearum.

Terminorum expositiones per omnia sunt hic, sicut
in tribus superioribus.

THEORICA ORBIVM SO-
lis & Veneris.



Scholia.

Linea augis Solis & Veneris D.A.

Linea medij motus Solis Veneris & Mercurij D.E.

Linea veri motus Veneris D.F.

Centrum mundi deferentis & aequantis ut in superioribus ordine.

Textus.

Textus.

PRIMA ET SECUNDA PARS

de orbibus & motibus eorum

periodicis.

I. Ac primum de deferentibus
apogion æquantis.

Mercurius habet orbes quinque & epicyclum, quorum extremi duo sunt eccentrici secundum quid. Superficies namq; conuexa supremi & concava infimi mūdo concentricæ sunt, concava autem supremi & conuexa infimi eccentricæ mundo, sibiipsis tamen concentricæ. Et centrum earum tantum à centro æquantis, quantum centrum æquantis à centro mundi distat. Et ipsum est centrum parui circuli, quem centrum deferentis, ut uidebitur, describit. Vocantur autem deferētes augem æquantis, & mouentur ad motum octauæ sphaeræ super axe zodiaci.

2 De deferentibus augem eccentrici.

Inter hos extremos sunt alij duo similiter difformis spissitudinis intra se quintum orbem, scilicet epicyclum deferentem, locantes. Superficies namque conuexa superioris & cōcava inferioris idem cum paruo circulo cētrum habent. Sed concava superioris & conuexa inferioris unā cum utrisque superficiēb. quinti orbis aliud cētrum habent mobile, quod centrum deferentis dicitur.

Hi duo orbes augem eccentrici deferētes uocantur, & mouentur regulariter super cētro parui circuli cō-

tra successione signorum tali uelocitate, ut præcise in tempore, quo linea medij motus solis unam facit reuolutionem, & orbes isti in partem oppositã similiter unam perficiant. Et fit motus iste super axe quandoq; æquidistante axi zodiaci, & per centrũ parui circuli trãseunte.

Motũ autem horum orbium sequitur, ut centrũ orbis deferẽtis epicyclum circũferentiã quandã parui circuli similiter in tanto tempore regulariter describat. Huius uerò semidiameter est tanta, quanta est distantia, qua cẽtrum æquantis à centro mundi distat. Vnde hæc arcũferentia per centrum æquantis ibit.

III. De deferente epicyclum.

Sed orbis quintus epicyclũ deferens, intra duos secundos locatus mouetur in longitudinem secundũ successione signorum centrum epicycli deferendo regulariter super centro æquantis, quod quidem in medio est inter centrum mundi, & centrum parui circuli.

Scholia in appositam figuram.

Centrum mundi C. Centrum æquantis D.

Centrũ parui circuli E. Centrũ deferentis F.

Hic sunt quatuor orbes difformes, quorũ extremi salicet minimus & maximus deferẽtes augẽ æquantis dicuntur.

Duo difformes medij deferentes augem eccentrici.

Deferentis eccentrici circũferentia S.O.K.

Æquantis autẽ N.O.R. Epicyclus orbiculus T.


Axis deferentiũ augem æquantis, qui pars est axis eclipticæ octauæ sphaeræ L.C.M.

Axis deferentium augem eccentrici Q.E.P.

Axis deferentis epicyclum O.F.R.

THEORICA CENTRORVM

orbium & axiū Mercurij.



Textus.

Hāc tamen habet uelocitatē, ut centrū epicycli in eo tempore semel reuoluatur, in quo linea mediū motus solis unam complet reuolutionem. Habet se nāque Mercurius in hoc ad solem, ut Venus, fit enim semper, ut medius

E 4

motus

motus solis sit etiam medius motus horum duorum.

Ex his igitur & dictis superius manifestū est, singulos sex planetas in motib. eorum aliquid cum sole communicare, motumq; illius quasi commune speculum & naturæ regulam esse motibus illorum.

Huius autem orbis epicyclum deferentis motus fit super axe imaginario, cuius extremitates (sicut apparuit in Venere) propter motum alium in latitudinem similiter accedunt ad polos zodiaci, & ab eis recedunt. Axis autem iste secundum se totum mobilis est secundū motum centri deferentis in paruo circulo.


Collatio Mercurij cum Luna.

Patet itaq; sicut in luna centrū epicycli bis in mēse lunari deferentes auge eccentrici pertrāsīt, ita in Mercurio centrū epicycli bis in anno deferētes auge epicycli deferentis peragrarē. Nō tamen est in auge deferētis, nisi semel. Aux enim deferentis Mercurij non circulariter mouetur circulares reuolutiones cōplendo, sicut in luna contingit, sed propter motū centri deferētis in paruo circulo, nunc secundū successionē signorū, nūc cōtra procedit. Habet nāque limites certos, quos egredi ab auge æquantis recedendo non ualet, sed cōtinuē sub arcu zodiaci à duabus lineis circulū parū contingētib; à centro mundi ad zodiacum ductus cōpræhensō, ascendendo & descendendo uoluitur atq; reuoluitur.

De puncto F.

Quotiescunq; enim centrum epicycli fuerit in auge deferentis, ipsum etiam motuum similitudinē erit in au-

THEORICA OMNEM FERE VARIETATEM
 tem motus centri epicycli & apogij eccentrici
 Mercurij ostendens.



Collocanda est hæc figura ante Pag. 65.

ge æquātis, & centrū deferentis in auge sui parui circuli. Quia tunc æntrum epicycli in maxima remotione à centro mundi fiet, & centrū deferentis in duplo plus distabit a cētro æquantis, q̄ centrū æquātis à cētro mūdi.

Scholia in figuram appositam.

Centrum mundi C. æquantis D. parui circuli E. deferētis in maxima à centro mundi remotione punctū F.

Paruus circulus quem centrū deferentis raptu deferentium augem eccentrici deferentis contra signorū ordinem quotannis describit signis 12. distinctus, & literis signatus F.R.P.V.D.4.O.E.

Augis æquantis linea C.D.A.

Linea augis deferentis, epicyclo in auge constituto D. N.

Quatuor porrò reuolutiones reperiuntur æquales, hoc est temporibus æquis peractæ circa orbes Mercurij, utpote reuolutio deferentium augem deferentis epicyclum, reuolutio cētri epic. ad motū deferentis iuxta arcumferentiam oualē circunvolutio centri deferentis in paruo circulo. F.R. P. ac reuolutio accessus & recessus augis deferentis. Siquidem quandocunque centrū epicycli per augē transit, utraq; aux est sub eodem puncto & deferentis centrum in auge sui parui circuli F. Mox uerò ex auge epicyclo soluente ac quatuor ferme mētib. ad K. sensim accedente deferentis eccentrici augē deferētes contra signorum ordinem, pariq; uelocitate qua

te quatuor signis ab auge æquantis recedunt, ac deferentis centrum ad punctum P. deducunt. Cuius motum imitatur quodammodo linea augis deferentis usque ad G. recedens ex N. & eius oppositum in L. ex Q. duobus deinde mensibus ex H. ad B. epicyclus perueniet itidem ex puncto P. duobus signis centro deferentis progressu accedat ad centrū æquantis utraq; auge unā iunctis. Præterea ex B. ad K. epicyclo translato, ac (ut in H. fuerat) terris uicinissimo centrum deferentis erit iam in puncto. O. auge ad. i. maximum uersus ortum ab auge æquantis recessum perducta. Hinc quatuor mensibus exactis quæuis harum reuolutionum concludetur epicyclo ad utrāq; auge reuerso & deferentis centro ad notā F. restituto tū augibus, tū eorū oppositis in eadem linea compositis: ac recurrentibus annis reuolutiones usque similes referentur.

Textus.

DE ARCV. F. P. ET PUNCTO
contactus occidentali P.

Deinde uerò cum centrum deferentis per motum orbium duorum secundorum mouebitur ab auge sui arcu uersus occidentem, centrum epicycli per motum deferentis mouebitur ab auge æquantis tantundem uersus orientem. Vnde centrum deferentis ad centrum mundi incipit accedere, & aux deferentis ab auge æquantis

quantis uersus occidentem reædit continuè, donec centrum deferentis fuerit in linea contingente circulum occidentali. Id autem fit, cū ab auge parui circuli quatuor signis distiterit, & tunc similiter centrum epic. ab auge æquantis uersus orientem distabit, quatuor signis. Aux autem deferentis erit in maxima sua ab æquantis auge uersus occidentem remotione. Atque in hoc situ centrum epicycli fiet in maxima sua, quam solet habere ad centrum mundi, acceßione, non tamen tunc erit in opposito augis deferentis, nec in linea ad paruum circulum contingenter per centrum mundi producta.

DE SECVNDO ARC V.P.D.

& puncto tertio .D.

Post enim descendente centro deferentis uersus centrum æquantis, aux deferentis incipit reaccedere uersus auge æquantis. Centrum autem epicycli proportionaliter descendet in altera medietate uersus oppositum augis æquantis. Vnde magis remouebitur à centro mundi, nec perueniet ad oppositum augis deferentis, nisi cū ipsum fuerit in opposito augis æquantis. Id autem fiet, cū centrum deferentis perueniet in centrum æquantis, & tunc aux deferentis erit etiam cum auge æquantis, & tam deferens, quàm æquans (ex quo æquales in quantitate constituuntur) erunt circulus unus, & plus distabit à centro mundi centrum epicycli tunc, quàm distabat, cū erat in situ ab auge æquantis per signa quatuor.

DE

DE TERTIO ARCV. D. O. ET
puncto contactus orientali. O.

Hinc autem cum centrum deferentis recedet, à cētro æquantis in suo circulo ascendendo, centrum epicycli recedet ab opposito augis æquantis & deferentis. Et continuè magis centro mundi propinquabit. Sed aux deferentis remouebitur ab auge æquantis uersus orientem continuè, donec perueniet centrum deferentis ad lineam contingentem circulum paruum à parte orientis, qui pūctus contactus etiā ab auge parui circuli uersus orientem quatuor signis distat. Tūc enim aux deferētis fiet in maxima remotione ab æquātis auge uersus orientem, & centrum epicycli iterum erit in maxima eius ad terram acensione, quam habere solet. Non tamen erit in opposito augis deferentis.


VLTIMVS ARCVSO. F. ITE-
rum cum puncto F.

Ab hoc uero loco ascendente cētro deferentis uersus augem parui circuli, aux deferentis continuè reuertetur ad augem æquantis, & centrum epic. magis elōgabitur à centro mundi uersus augem æquantis ascendendo, usque dum centrum deferentis ad augem parui circuli perueniet. Nam tunc aux deferentis erit cū auge æquantis, & centrum epicycli similiter tam in auge deferentis, quā æquantis. Vnde iterum erit in maxima remotione à centro mundi, sicut primo, Rursusq; de-
inde

inde similis, ut iam dicta est, mutatio redibit.

SVBIVNGIT IAM VELVT EP-
ilogum sex correlaria, quib. superiorem pro-
positionem, adeoq; collationem Mercurij
cum Luna, imò cum reliquis item
planetis, clarius exponit.

¶ Ex his primò uidetur in anno tantum semel cē-
trum deferentis esse idem cum centro equantis, aliàs
autem semper deferentis cētrum à centro mundi distan-
tius esse, quàm equantis centrum. Quare sequitur con-
trarium ei, quod in superiorib. & Venere accidit, ut si-
licet quantò centrum epicycli uicinius augi equantis fu-
erit, tantò uelocius, & quantò uicinius eius opposito, tã-
tò tardius moueatur.



Scholia.

Signatis æqualibus æquantis arcubus, altero uideli-
cet ad augem, et ad eius oppositum, altero, cum defe-
rentis arcubus prædictis respondētibus, hos in eccentri-
co signatos comperies inæquales, utpote N. M. maiorem
A. B. hos tamen temporum æquis spatijs epicyclus per-
transit.

Textus.

II. Secundo, licet centrū epicycli tantū semel in
maxima remotione fuerit in anno à centro mundi, bis
tamen in maxima propinquatione, quam habere solet,
ipsum esse contingit. Similiter quanquā bis in anno sit
in maxima accessione, tamen tantū semel in anno in
opposito augis deferentis reperitur.

III. Ter-

III. Tertiò, necesse est, ut oppositum augis deferentis centro epicycli extra augem æquantis, aut oppositum eius existente, inter centrum epicycli & oppositum augis æquantis semper uersetur, aliquando quidem uersus centrum epicycli, aliquando ab eo, tam præcedendo, quàm sequendo sese deuoluens.

IIII. Quartò, sicut aux deferentis ad certos limites utrinque ab auge æquantis remouetur, ita etiam se habet oppositum augis deferentis respectu oppositi augis æquantis. Maior tamen est arcus huiusmodi motus augis deferentis, quàm arcus motus oppositi eius. Vnde motus unius motu alterius uelocior erit.

V. Quintò, & si centrum epicycli contingat esse in puncto deferentis à centro mundi remotissimo, nunquàm tamen est in puncto deferentis, quem centrum mundi uicinissimum esse contingit. Nam dum centrum epicycli fuerit in auge deferentis, talis est habitudo deferentis, ut oppositum augis eius sit centro mundi ita uicinum, quòd in quacunque alia deferentis, quam habet, habitudine nullus punctus eius uicinior, aut tam uicinus centro mundi reperiatur. In tali autem puncto, quem uicinissimum esse cõtingit, centrũ epicycli nõ est eo tẽpore, quo propinquissimum eũ esse cõtingit, sed in eius opposito.

VI. Sextò, ex dictis apparet manifestè, centrum epicycli Mercurij propter motus supra dictos, non ut in aliis planetis fit, circumferentiam deferentis circularem, sed potius figuræ habentis similitudinem cum plana ouali peripheriam describere.

IIII. DE MOTV AC PERIODO EPICYCLI.

Epicyclus uerò in longitudinem mouetur sicut epicyclus Veneris, reuolutionem tamen unam in quatuor mensib. solarib. ferè super æntro suo perfiat.

TERTIA PARS DE VOCABVLIS linearum & ararum.

Termini autem tabularum hic, sicut in superioribus declarantur, nisi quòd diuersitas in minutis proportionalib. aliqualis existit.

Aequationes enim argumentorum Mercurij, quæ in tabulis scribuntur sunt, quæ contingunt, dum æntrum epicycli fuerit in mediocri eius à terra remotione. Hoc autem accidit æntro epicycli ab auge æquantis per duo signa quatuor gradus & triginta minuta distante. Sed in aliis planetis æntro epicycli in longitudine media deferentis existente fiebat. Item minima æntri epicycli Mercurij à centro mundi remotio fit, dum æntrum epicycli ab auge æquantis eius quatuor signis distiterit. Hæc autem in aliis æntro epicycli in opposito augis æquantis existente continebat.

DE MINVTIS PROPORTIONALIB. & diuersitate diametri.

*Minuta igitur proportionalia longiora sunt ex æssu
remo-*


remotionis centri epicycli maximæ super mediocrem eius remotionē, in sexaginta partes æquales diuisus. Sed minuta proportionalia propiora dicuntur ex æssus remotionis centri epicycli mediocris super remotionem eius minimam, similiter in sexaginta particulas æquales diuisus. Et secundum hoc duplex diuersitas diametri definiatur. Quia tamen à loco maximæ accessionis centri epicycli uersus oppositum augis æquantis minuta proportionalia propiora minuuntur, quæ prius à loco mediocris remotionis usque ad locum maximæ accessionis continuè augebantur, ideo dicitur in Mercurio minuta proportionalia tripliciter se habere, quæ tamen in Venere atque tribus superiorib. dupliciter, in luna uerò simpliciter, ut manifestè patuit, se habere solent.

F

SCHE-

SCHEMA MINVTORVM

proportionalium Mercurij.



Scholia.

Minuta proportionalia quauis hic triplicia sint, ad
longiora

longiora tamen & propiora reducuntur, quorum & diuersitatum diametri usus hic perinde se habet, ut in tribus superioribus dictum est.


SECUNDA PARS LIBELLI

DE PASSIONIBVS PLANE-
tarum diuersis.

PRIMUM GENVS PASSIO-
num seu accidentium, quorum caussa in-
telligitur collatione eccentrici
& epicycli.

Planeta dicitur directus, quando linea ueri motus eius secundum successionem signorum progreditur: Re-
trogradus autem contra. Stationa-
rius uerò dum hæc linea sta-
re uidetur.

SCHEMA PROGRESSVM
stationum & regressuum.



Scholia.

Eclipticæ extimus circulus & maximus.

Planetæ motui per superiorē partem epicycli scilicet ex F. per B. ad D. respōdet arcus eclipticæ G. C. E. At per inferiorē similē arcū in eclipticā describit, sed contra seriē signorū. Ceterū planeta stationarius est, quando

quando per inferiorem partem epic. contra signorum ordinem in ecliptica tantum fertur, quantum iuxta signorum sequelam epic. centrum transi. Verum si planeta contra ordinem signorum maiorem motum habeat quam sit motus epicycli, planeta est retrogradus. In hac itaque figura M.B.L. est arcus directionis, reliquum uero ut arcus L.H.M. regressionis arcus est.

Puncta stationum sunt primæ .L. Secundæ .M. quas in prima significationes author uocat.

Statio prima in secunda significatione arcus B.L.

Statio secunda in secunda significatione arcus .B.L.M.

Textus.

Statio prima in prima significatione, est punctus epicycli, in quo dum fuerit planeta, incipit retrogradari.

Statio secunda in prima significatione est punctus epicycli, in quo dum fuerit planeta incipit dirigi.

He uero stationes existente centro epicycli in eodem situ deferentis utrinque ab opposito augis ueræ epicycli æquidistant.

Statio prima in secunda significatione est arcus epicycli augem ueram epicycli, et punctum stationis primæ interiacens.


Statio secunda in secunda significatione est arcus epicycli ab auge uera per oppositum usque ad punctum stationis secundæ.

Arcus directionis est arcus epicycli à statione secundâ per augem usque ad stationem primam in prima si-

gnificatione.

Arcus autem retrogradationis est arcus epicycli à puncto stationis primæ per oppositum augis ad punctum stationis secundæ.

Hi uerò arcus maiorantur propter prædictorum punctorum uariationem. Quantò enim centrum epicycli uicinius fuerit opposito augis æquantis, tantò puncta stationum uiciniora sunt opposito ueræ augis epicycli. Hoc idem tantò magis euenit, quantò planeta maiorem epicyclum & motum argumenti tardiorem habet.



Vnde

Vnde & tempora directionum aut retrogradationum in quantitibus suis uariantur.

Exit enim tempus tale, cum arcus eius per motum argumenti in uno die diuiditur.

Ex dictis sequitur, si statio prima subtrahitur à toto circulo, remanet statio secunda, sed subtracta statione prima à secunda, arcus retrogradationis habebitur, qui de toto circulo demitur, manet arcus directionis.

Lunæ tamen quanquàm epicyclum habeat, sicut aliis quinque statio siue retrogradatio non accidit propter uelocitatē motus centri epicycli eius. Semper enim centrum epicycli maiorem arcū zodiaci, quolibet die secundū sucessionem describit, q̄ sit arcus zodiaci correspondens arcui epicycli, quem centrum corporis Lunæ quocunque die contra sucessionem in superiori parte epicycli perambulat. Veruntamen eam, dum in superiori medietate epicycli fuerit tardam, in inferiori uelocem cursu fieri necesse est.

Tardi dicuntur Planete & minuti cursu, cum linea ueri motus eorum tardius, quàm linea mediū motus, aut contra sucessionem incedit.

Veloces uerò & aucti cursu, quando uelocius secundum sucessionem mouentur.

Aucti numero, quando æquatio additur super medium motum, Minuti uerò, quando minuitur.

Aucti lumine, cum recedunt à sole, uel sol ab eis. Mi-

nuti uerò lumine, cum accedunt ad solem, uel sol ad eos.

Orientales & matutini cum oriuntur ante solem.

Occidentales uerò & uespertini, cum occidunt post So-
lem.

Orientes, ortu matutino sunt, qui de sub radiis exeun-
tes propter remotionem eorum à sole, uel solis ab eis, ma-
ne ante ortum solis apparere incipiunt.

Orientes ortu uespertino sunt, qui de sub radijs exe-
untes propter remotionem eorum à sole uesperis post
solis occasum apparere incipiunt.

Occidentes occasu matutino sunt, qui radios solis in-
grediuntur, propter accessum eorum ad solem manè oc-
cultari incipiunt.

Occidentes autem occasu uespertino sunt, qui solis ra-
dios ingrediuntur, & propter accessum eorum ad solem,
aut solis ad eos uesperis post solis occasum incipiunt oc-
cultari.

Tres superiores non occidunt occasu matutino, nec
oriuntur ortu uespertino, sed Venus & Mercurius atque
Luna.

DE PRIMO ASPECTU NO-

ue seu nascentis

Lunæ.

Triplex est ratio, cur Luna post coniunctionem suam
cum sole quandoque citius, quandoque tardius appareat.

Vna declinatio siue obliquitas zodiaci & horizō-
tis.

tis. Nam si fit coniunctio sub ecliptica in medietate tamen à fine Sagittarij ad finem Geminorum, tunc cum sol occidendo in horizonte fuerit, plures gradus erunt in arcu reuolutionis Lunæ à Luna ad Horizontem, quam de zodiaco à Luna ad Solem. Vnde in climatib. septentrionalib. atius uideri poterit, quam si fuisset in altera zodiaci medietate.


Secunda est latitudo Lunæ ab ecliptica. Nam si post coniunctionem mouetur in latitudinem septentrionalem, iterum atius uideri poterit, quam si moueretur in latitudinem meridianam.

Tertia est uelocitas motus Lunæ ueri. Nam si uelox est motu, atius apparet, quam si tarda foret.

Sche-

SCHEMA Q VANDO LV

na nascens citius sese nobis osten-
dat ex prima caussa.




SCHE-

PLANETARVM.
SCHEMA QVANDO LV-

83

na ex prima caussa tar-
dius emergit.





Fit

Fit igitur quandoque, ut omnes hæ causse concurrant: tunc eodem die & uetus & noua apparet, quandoque autem duæ tantum: tunc secundo die post coniunctionem, quandoque uerò una sola: tunc in tertio die uidetur. Quandoque etiam omnium eorum oppositum accidit: tunc quarto die contingit eam apparere.

Scholia in sequentem figuram.

Nisi Luna eclipsetur siue in plenilunio seu nouilunio aut alio quouis tempore, medietate ut minimum illuminatur, quod præsens figura monstrat.






PASSIONES
TERTIVM GENVS PASSIO-
num, quæ accidunt planetis
inuiçem collatis.

Aspectus planetarum trinus est, cum per tertiam
partem, Quadratus, cum per quartam, Sextilis uerò, cū
per sextam eclipticæ partē eorū uera loca destiterint.

SCHEMA ASPECTVVM
seu configurationum.



QVARTVM GENVS PASSIO-
num, quæ accidunt Planetis, ac præcipuè
luminarib. collatis ad terram.

Coniunctio media planetarum fit, quando lineæ me-
diorum motuum eorum secundum longitudinem zodia-
ci coniunguntur.

Vera autem, quando lineæ uerorum motuum sic cõ-
ueniunt.

Sed uisibilis quando lineæ ab oculo nostro per cen-
tra corporum suorum eductæ coniuguntur in unum.

Similiter de oppositione media & uera dicendum.

Et attenduntur hæc in eisdem signo gradu & mi-
nuto.

Ex isto patet sæpe coniunctionem ueram esse, quã-
do media præcessit aut futura est. Sæpe etiam ueram es-
se, quando tamen uisibilis non est, aliquando etiam uisi-
bilem ueram præcedere, quandoque uerò sequi.


DE DIVERSITATE ASPECTVS,
quam Ptolemæus uocat $\pi\sigma\acute{\alpha}\lambda\lambda\alpha\acute{\epsilon}\iota\mu$.

Locus uerus astri est punctus firmamenti lineam à
centro mundi per centrum astri protentam terminans.

Locus autem uisus siue apparens per lineam ab ocu-
lo per centrum astri protractam determinatur.

Diversitas aspectus astri est arcus circuli magni
per zenith & uerum locum astri transeuntis inter lo-
cum astri uerum & apparentem interceptus.

Schema

SCHEMA PARAL-
LA XEOS.

Scholia.

Luna existente in F. centro mundi A. oculo in G.
erit uerus locus Lunæ punctus B. uisus uerò. D. est itaq;
D.B. diuersitas aspectus Lunæ.

Solis autem in pūcto E. constituti erit uerus locus. C.
Sed uisus locus erit. D. & D.C. diuersitas aspectus eius
quæ minor est diuersitate aspectus Lunæ arau. C.B. qua-
propter erit. C.B. diuersitas aspectus Lunæ ad Solem.
Quo autem stella & centro mundi propior est & supra
horizontem altior, eo minorem diuersitatem aspectus
habet.

Textus.

Inde manifestum est, quantò uicius astrum cen-
tro mundi & horizonti fuerit, tantò maiorem habe-
re diuersitatem aspectus. Hanc quoque maximam in
Luna

Luna reperiri: In Marte uerò non benè perceptibilem. Habet nanque semidiameter terræ, sensibilem ad semidiametrum orbis Lunæ, non multum autem perceptibilem ad semidiametrum orbis Martis magnitudinem.

*Diuersitas aspectus astri in longitudine est arcus e-
clipticæ inter duos circulos magnos interceptus, quorum
unus per polos eclipticæ & locum uerum proædit, al-
ter autem per eosdem polos & locum astri uisum.*

*Diuersitas astri in latitudine est, arcus circuli magni
per polos zodiaci transeuntis, & locum astri uerum
interceptus inter duos circulos eclipticæ æquidistantes,
quorū unus per locum ueri astrū progreditur, alter per
locum eius uisum. Id autem quod de his circulis æquidi-
stantibus eclipticæ interceptus inter circulos magnos per
polos zodiaci transeuntes, simile est diuersitati aspectus
in longitudine.*


*Vnde diuersitas aspectus est quasi linea diagonalis
quadranguli, cuius latera sunt diuersitates aspectus in lon-
gitudine & latitudine.*

G

SCHE-

90°

PASSIONES
SCHEMA PARALLAXEON
secundum omnes species.



Scholia.

Ecliptica A.B.C. cuius polus D.

Zenith E.

Locus verus stelle.F.

Locus

Locus ipsius apparens. G.

Diuersitas aspectus in longitudinem. B. C. uel F. H.

Diuersitas aspectus iuxta latitudinem F. K.

Vniuersalis diuersitas aspectus arcus diagonius
F. G.

Textus.

Diuersitas aspectus lunæ ad solem est exæssus diuersitatis aspectus lunæ super diuersitatem aspectus solis.


Si uera coniunctio luminarium fuerit inter gradum eclipticæ ascendentem, & nonagesimum eius ab ascendente, uisibilis eorum coniunctio præcessit ueram. Si autem inter eundem nonagesimum, & gradum occidentem fuerit, uisibilis ueram sequetur. Sed si in eodem gradu nonagesimo acciderit, tum simul uisibilis coniunctio cum uera fiet, nullaq; diuersitas aspectus in longitudine continget. Nonagesimus namque gradus eclipticæ ab ascendente, semper est in circulo per zenith, & polos zodiaci procedente.

G 2

Sche-

SCHEMA APPARENTIVM

& uerarum synodorum.



Scholia.

Sole per quartam occidentalem currente, linea uisibilis, ueram lineam in consequentiam signorum sequitur. accidente igitur in hac quarta coniunctione lune & solis, præcedet uera coniunctio uisibilem, ut in præsentī figura ad ueram solis lineam. L. N. O. prius luna accedit, quàm ad uisibilem B. I. P. At in quarta orientali contrariū semper euenit, ut ex eadem figura oculis subiātur.


Textus.

Latitudo lune uisa est arcus arcuuli magni per polos zodiaci & locum lune uerum aut uisum transeuntis inter eclipticam & arculum sibi æquidistantem incidentem per locum uisum interceptus.

Digiti ecliptici dicuntur duodecimæ diametri corporis so-

laris aut lunaris eclipsatæ.

Typi eclipticorum punctorum.



Textus.

DE DVRATIONE ET QVAN-
titate Lunarium defectuum.

Minuta casus in eclipsi lunari sunt minuta zodiaci, quæ Luna perambulat Solem superando à principio eclipsis usque ad medium eius, si particularis fuerit, aut uniuersalis sine mora, uel à principio usque ad initium totalis obscurationis, si uniuersalis cum mora fuerit.


Minuta moræ dimidiæ sunt minuta zodiaci, quæ Luna Solem superando à principio totalis obscurationis, usque ad medium eius perambulat.

Minuta casus in eclipsi solari, sunt minuta quæ Luna à principio eclipsis usque ad medium superatione

sua ultra solem perficit.

Quare si minuta ista per superationem lune in hora diuidantur, tempus, quo ea pertransit, eueniet.


TYPVS ECLIPSIS,



Orbis niger umbræ terræ crassitiem in loco transitus lune tempore eclipsis designat. Quatuor autem orbiculi quatuor lune situs, uidelicet & fine eclipsis ac in principio, & fine moræ iuxta in utrisque locis suam latitudinem representant.

PLANETARVM.
TYPVS HVIVS DE-
FECTVS.

95



Diameter solis uisualis Eccentrici. 31. minuta chordat, sed in opposito triginta quatuor. Semper tamen, quæ est proportio quinque ad sexaginta sex, ea est motus solis in hora ad diametrum suam uisualem.


Lunæ uerò in auge Eccentrici & Epicycli 29. minuta, sed in auge eccentrici & opposito augis epicycli triginta sex. Semper tamen quæ est proportio 48. ad 47. ea est motus Lunæ in hora ad diametrum suam uisualem.

Quare sequitur quòd possibile sit, ut etiam quandoque solis eclipsis accadat uniuersalis. Nunquam tamen naturaliter apparere potest ratione diuersitatis aspectus, ut totus sol toti terræ uniuersaliter eclipsetur.

Scholium in sequentes figuras.

Prima harum figurarum eclipses lunares representat particulares in A. & B. uniuersalem in D. mutuum duntaxat contactum in C.

Defectus uniuersalis solis apparet homini in plaga B. constituto in C. uerò particularis, de quo ad D. nil apparet ob diuersitatem aspectus Lunæ, ut in secunda figura perspicitur.



Textus.

Dum sol in auge eccentrici fuerit, diameter umbræ in loco transitus lunæ se habet ad diametrum lunæ visua-lem, sicut tredecim ad quinque.

Excessus autem eius, dum sol est in auge super diametrum eius, dum sol alibi fuerit in eccentrico, decuplus est ad differentiam motuum solis in hora, quibus dum est in auge atque illo loco alio movetur.

QVINTVM GENVS PASSIO- num de declinatione & latitudine.

Declinatio stellæ est distantia ipsius ab æquinoctiali, & computatur in circulo transeunte per polos mundi, & verum locum stellæ, quem linea à centro mundi per centrum corporis stellæ ducta designat.

Latitudo autem stellæ est distantia eius ab eclipticæ, & computatur in circulo per polos eclipticæ & verum locum stellæ modò dictum eunte.

Ex his & de Sole supradictis manifestum est, Solem nullam habere latitudinem, licet declinationem habeat, eò quòd semper superficies deferentis eius in superficie eclipticæ permaneat.

DE LATITVDINE LVNAE.

Luna autem & alij quinque latitudinem habent.

In luna

In luna nanq; propter declinationem axis augem mo-
uentium ab axe zodiaci superficies plana deferentis e-
ius semper superficiem planam eclipticæ secat super
diametro mundi ab eadem in partes oppositas decli-
nâdo quantitate suæ maximæ declinationis semper ea-
dem inuariabiliter permanente. Superficies nanq; pla-
na epicycli eius nunquàm à superficie deferentis recē-
dit. Quapropter non habet nisi latitudinem unam,
scilicet quæ propter declinationem deferentis ab eclipti-
cæ contingit. Hæc autem cognoscitur per argumentum
latitudinis lunæ uerum.


Vnde argumentum latitudinis Lunæ medium est ar-
cus zodiaci inter lineam ueri motus capitis draconis, &
lineam mediij motus Lunæ secundum successionem signo-
rum acceptus.

Argumentum autem latitudinis Lunæ uerum, est ar-
cus zodiaci à linea ueri motus capitis ad lineam ueri mo-
tus lunæ numeratus secundum successionem.

Subtracto igitur uero motu capitis de uero loco lu-
næ, aut addito uero motu lunæ cum medio motu capi-
tis, argumentum latitudinis lunæ uerum prodibit.

Scholia

ferentis à superficie eclipticæ in oppositas partes, sicut in luna, semper quantitate maxima inuariabili manente. Inter sectiones tamen deferentium cum eclipticâ super diametro mundi, quæ etiam caput & cauda dicuntur, non mouentur, sicut in luna contra successione signorum, sed sicut dictum est, secundum motum octauæ sphaeræ, ita ut auges deferentium illorum semper circūferentias eclipticæ æquidistantes à parte septentrionis describant. Quanquàm autem auges illorum semper sint septentrionales, non tamen in omnib. tribus sunt puncta maximarum latitudinum deferentium ab eclipticâ, imò solùm in Marte sic est, ut aux deferentis maximè declinet ad aquilonem ab eclipticâ, sed in Saturno talis punctus distat ante augem sui deferentis, scilicet contra successione quinquaginta gradib. In Ioue uerò post augem, scilicet secundum successione gradibus uiginti.



Scholia.

Augestrium superiorum Saturni in. A. Martis in
B. Iouis in. E.

Textus.

Latitudinem autem aliam ex parte superficiei planæ
epicycli quandoque à superficiei deferentis plana de-
clinantis. Mouetur enim epicyclus in latitudinem re-
spectu augis ueræ super axe suo per æntrum eius &
longitudi-

longitudines medias transeunte, taliter tamen, ut cum centrum epicycli fuerit in nodo capitis, aut caudæ, aux uera & oppositum epicycli directè sint in superficie deferentis, & superficies epicycli in superficie eclipticæ. Postquã autem recedit à nodo, diameter augium epicycli declinare incipit à superficie deferentis, ita quod oppositum augis ueræ epicycli remoueri incipit a superficie deferentis uersus eam partem, ad quam medietas deferentis, per quam tunc moueri centrum epicycli incipit ab eclipticâ, & aux uera epicycli tantundem ad partem oppositâ. Et sic continuè remouentur aux & oppositum augis epicycli à superficie deferentis, donec centrum epicycli perueniet ad punctum deferentis maxime ab eclipticâ declinantem, scilicet inter duos nodos medium, ibi tunc maxime epicycli superficies cū dicta diametro à deferente declinat. Ab hoc autem loco successiue declinatio epicycli à deferente minoratur, usquequo centrum epicycli peruenit ad nodum alium, in quo iterum tota superficies epicycli erit in superficie eclipticæ, & diameter augium uerarum in superficie deferentis. Unde axis super quo fit motus iste in latitudinem, semper dum centrum epicycli extra nodos fuerit, superficie eclipticæ æquidistabit.

QUATVOR CORRELARIA.

1. Ex his apparet primò, quod axis (ut dictum est superius) super quo fit reuolutio epicycli in longitudinem, axi eclipticæ quandoq; æquidistat, quandoq; uerò non, nunquam autem axi eccentrici æquidistabit.

2. Secun-

2. Secundò, semper corpus planetæ, dū in superiori medietate epicycli fuerit, centro epicycli extra nodos existente, erit inter duas superficies, scilicet eclipticæ & sui deferētis. Dum autē fuerit in inferiori medietate epicycli, erit distantius ab eclipticā, quā deferens ab eadem. Non igitur semper astrum inter deferentem & eclipticam reperietur.

3. Tertiò, auges epicyclorum ueras, & medias non semper terminos esse linearum, quæ per æntrum epicycli trahuntur, ueruntamen eas per tales lineas contingit determinari. Vnde aux media epicycli semper est in superficie plana orthogonaliter superficiem deferentis in linea augis mediæ secāte, & aux uera epicycli in simili superficie secante deferentem in linea augis ueræ.

4. Quartò, manifestè patet, æntra deferentium & æquantium à superficie plana eclipticæ declinare.

Latitudines autem horum, quæ scribuntur in tabulis, contingunt dum æntrum epicycli in puncto deferentis maximè declinante fuerit.

DE LATITVDINIBVS VENERIS & Mercurij.

Sed Venus & Mercurius triplicem solent habere latitudinem, unam ex parte deferentis, quæ deuiatio dicitur, aliam ex parte inclinationis diametri augis ueræ & oppositi epicycli, quæ inclinatio uocatur, tertiam ex parte reflexionis diametri longitudinum mediarum respectu augis ueræ, quæ reflexio appellatur.

De

DE DEVIATIONE SEV

ἐγκλίσει eccentricorum.

Superficies nanque deferentis in latitudinem, nunc ad partem septentrionis, nunc meridiei super diametro mundi mouetur, cuius motus poli utrinque ab auge æquantis nonaginta gradib. eclipticæ distant. Ibi enim caput & cauda fiunt, hîc tamen motus latitudinis motui æntri epicycli taliter est proportionatus, ut quando æntrum epicycli fuerit in aliquo nodorũ, saliet nonaginta gradib. ab auge æquantis distans, nulla est deuiatio deferentis, sed tota superficies eius in superficie eclipticæ existit. Deinde æntro epicycli eius à nodo recedente incipit deferens deuiare, ita ut medietas eius, quam ingreditur centrum epicycli, in Venere quidem semper declinet ad aquilonem, in Mercurio uerò semper ad austrum. Et augetur successiuè deuiatio, donec æntrum epicycli peruenerit ad augem deferentis, uel eius oppositum, tunc enim deuiatio est maxima, in Venere quidẽ minuta decem, sed in Mercurio minuta quadraginta quinque, quæ ulterius continuè minoratur usquequo æntrum epicycli in nodum alium peruenerit. Vbi rursus nulla fiet deuiatio. Pòst iterum fiet, ut prius.

Vnde patet, sicut nunquàm æntrum epicycli Veneris uersus meridiem deuiat ab eclipticæ, ita nunquàm æntrum epicycli Mercurij uersus Aquilonem contingit deuiare.

Manifestum est etiam motum circuitionis centri epi-

H

cycli in

cycli in deferente æqualem esse reditioni deferentis in latitudine.

Hinc similiter apparet polos, super quib. fit motus deferentis in longitudinem, ut dictum est supra, nunc ad polos zodiaci accedere, nunc ab eis remoueri.

Propter dictas autem deuiationes orbibus prænumeratis alium mundo concentricum prædictos omnes includentem superaddi uidetur oportere, ad cuius motû trepidationis prædictæ deuiationes accidant.

πρὶ ἐγκλίσεως siue de inclinatione epicycli.

Sed superficies epicycli. plana à superficie deferentis hac atque illac declinando, mouetur. Primò super diametro epicycli per longitudines medias ab auge uera eunte, quo motu fit, ut diameter augis ueræ & oppositi superficiem deferentis secet, ita ut aux uera in unâ partem & oppositum in aliam à deferente declinent.

Hæc tamen declinatio motui centri epicycli. taliter proportionatur, ut quodocunque centrum epicycli. fuerit in auge æquantis, dicta diameter nusquam à deferente declinet, sed in superficie eius constituatur, Cetro autem epicycli. ab ea recedente, aux uera epicycli à superficie deferentis declinare incipit, in Venere quidem uersus Septentrionem, in Mercurio uerò ad meridiem, & oppositum augis ueræ ad partem oppositam. Quæ declinatio continuè augetur usquequo centrum epicycli ad nodum caudæ peruenerit, scilicet dum ab auge æquantis
nonaginta

nonaginta gradibus secundum successione[m] signorū distiterit. Tunc enim maxima dictæ diametri contingit declinatio, quæ postea continuè minorabitur, donec centrum epicycli ad oppositum augis æquantis peruenerit, ubi rursus nusquam dicta diameter declinat, sed in superficie deferentis constituitur. Inde uerò centro epicycli recedente uersus nodum alium, aux uera declinare incipit à superficie deferentis, in Venere quidē ad meridiem, in Mercurio autem ad Aquilonem, & oppositum augis ad partem oppositam, & maioratur successiue declinatio, donec ad nodum alium peruenerit centrum epicycli, ubi rursus maxima fiet. Dehinc autem decrescit, donec in augem æquantis uenerit, ubi, sicut primò, dicta diameter in superficie deferentis erit. Inde prior dispositio redit.

COLLATIO DEVIATIONIS

& inclinationis.

Quandocunque igitur maxima deferentis deulatio contingit, nullam epicyclus declinationē habet, & quando hæc nulla est, illa maxima est.

DE REFLEXIONE EPICYCLI.

Secundò autem mouetur superficies plana epicycli à superficie deferentis declinādo super diametro epicycli, per augem uerā & eius oppositū eunte. Quo motu fit, ut diameter epicycli per lōgitudines medias ab auge uerā transiens superficiem deferentis quandoque secet.

ita ut medietas epicycli sinistra in unam partem, dextra in aliam à deferente reflectantur. Sinistram autem uoco quæ post augem epicycli secundum successionem existit.

Hæc tamen dicta diametri reflexio, etiam motui centri epyc. proportionata est taliter, ut quandocunque centrum epic. fuerit in nodo capitis, scilicet in intersectione ante augem deferentis contra successionem signorum gradibus nonaginta, nulla sit dictæ diametri reflexio, sed in eadem superficie cum deferente loatur. Centro autem epicy. hinc uersus augem recedente, medietas diametri dictæ sinistra siue orientalis à superficie deferentis, in Venere quidem ad Septentrionem, sed in Mercur. ad Austrum incipit reflecti, altera uerò medietas uersus partem oppositam, quæ quidem reflexio continuè augetur, usquequo centrum epicycli ad augem æquantis uenerit, ubi tunc maxima fiet. Post uerò uersus nodum alium decrescet, donec ad eundem centrum epicy. perueniat, ubi rursus nulla accidet reflexio. Sed ab hoc loco centro epicycli transeunte uersus oppositum augis æquantis, iterum medietas sinistra diametri euntis per longitudines medias incipit reflecti, in Venere quidem ad Meridiem, ad Aquilonem autem in Mercurio, & augebitur usquequo ueniet ad oppositum augis æquantis, ubi tunc iterum maxima fiet. Hinc autem minuetur successiue usque dum centrum epicy. ad nodum capitis reuertitur, ubi nulla fiet reflexio, & rursus habitudo prior redibit.

PLANETARVM.
COLLATIO LATITV-
DINVM.

109

Manifestum est igitur in loco deferentis, ubi nulla contingit epicyc. declinatio, maximam eius reflexionem accidere. Deuiationes itaque ab ecliptica, declinationes autem & reflexiones à deferente computantur. Et quæ scribuntur in tabulis, sunt, quæ contingent, dum maxima fiunt.

Cum autem maxima contingit reflexio, scilicet in auge deferentis uel opposito existente centro epicycli, extremitas diametri, quæ reflectitur, minorem habet reflexionem, quam plures partes circumferentiæ epicycli sub ea uersus oppositum augis existentis. Punctus tamē circumferentiæ epicycli contactus, à linea eam contingente à centro mundi protracta, tunc præ cæteris maximā habet reflexionem.

Sicut itaque motus declinationis epicyc. fit super diametro, quæ reflectitur, ita eonuerso motus reflexionis epic. super diametro declinante accidit, unde uicissim una est axis motus alterius. Non igitur in istis, sicut in superioribus oportet axem, super quo fit motus inclinationis epicycli, cum extra nodos fuerit, superfici ei eclipticæ æquidistare.

Propter dictas epicyclorum inclinationes atque reflexiones, orbes parui epicyclos intra se locantes à quibusdam ponuntur, ad quorum motum eadem contingunt.

Octauæ uerò sphaera, ad cuius motum, ut saepe dictum est, orbes deferentes auges planetarum mutantur, triplex inest motus.

DE PRIMO MOTV.

Vnus quidem à primo mobili, scilicet diurnus, quo in die naturali semel super polis mundi reuoluitur.

DE SECVNDO MOTV.

Alter à nona sphaera, quæ secundum mobile uocatur, qui semper est secundum successione signorum contra motum primum super polis zodiaci regularis, ita ut in quibuslibet ducentis annis per unum gradum et uiginti octo minuta ferè progrediatur. Hic motus augium et stellarum fixarum in tabulis appellatur. Et est arcus zodiaci primi mobilis inter caput arietis primi mobilis et caput arietis nonæ sphaera. Superficies nanque eclipticæ nonæ sphaera semper est in superfacie eclipticæ primi mobilis.

DE TERTIO MOTV.

Tertius autem est sibi proprius, qui motus trepidationis uocatur, siue accessus et recessus octauæ sphaera, et fit super duos arcus paruos in concavitate nonæ sphaera æquales super primapia arietis et libræ eiusdē descriptos, sic quòd duo puncta certa octauæ sphaera (quæ capita arietis et libræ eiusdē uocantur) diametraliter

traliter opposita arcumferentias talium duorum arcuorum nonae sphaerae regulariter describant, cum hoc quod ecliptica octavae sphaerae semper intersecat eclipticam nonae (dum intersecat) saltem in capitibus. Cancrī & Capricornī nonae diametraliter oppositis.

Vnde sequitur, cum unus eorundem punctorum octavae est in medietate sui arculi meridionali, alter erit in medietate sui arculi septentrionali, ecliptica quoque octavae sphaerae semper eclipticam nonae in partes aequales (dum secat) secabit atque portiones arcuum parvorum alternatim aequales.


Velocitatis vero motus istius regula est ista, ut quilibet duorum punctorum circumferentiam sui parvi arculi, in quo circumfertur, in septem millibus annorum praecise perficiat.

Quaquam autem hoc motu praedicta duo puncta scilicet capita arietis & librae octavae sphaerae duas aequales circumferentias describant, nulla tamen alia puncta eius, circumferentias circumferentiarum describere contingit. Capita vero Cancrī & Capricornī octavae sphaerae quasi figuras coeales habentes pro basi lineas curvas, utrinque a capitibus. Cancrī & Capricornī nonae peragere necesse est. Vnde & quandoque praecedet ea, quandoque vero sequetur, quandoque autem coniunguntur. Coniunguntur enim caput Cancrī octavae & caput Cancrī nonae, dum caput arietis octavae fuerit in maxima latitudine ab ecliptica.

nona, quod accidit in circulo magno per polos zodiaci nona, & centra circulatorum transeunte.

Poli autem eclipticae octavae improprie dicti poli quandoque accedunt ad polos eclipticae nona, quandoque sunt sub eis, quandoque uero ab eisdem remouentur.

Talistas accessus & recessus semper est super circulo magno per polos zodiaci nona & centra circulatorum paruorum eunte.



Scholia.

Ecliptica nona sphaera A.B.C.D. cuius punctum A. in centro parui

parui circuli Principium Arietis. B. Canceri C. Libræ D. Capricorni. Eclipticæ octavæ tres diuersos situs representant reliqui tres circuli, cuius puncta principio Arietis & Libræ assignata circa Arietem & Libram nonæ, duos paruos circulos describunt, quorum semidiameter 9. gradus patet.

Cum autem Aries octavæ sphaeræ fuerit in F. puncto sui parui circuli septentrionali mouebitur per V. ad. G. dein ad. H. & inde ad. I. ac 7000. annorum elapsis, redibit ad. F. quo tempore & simili discursu principium Libræ octavæ circa principium Libræ nonæ suum circulum peragit eius oppositas partes responderenter transiens.

Cum mouetur itaque Aries octavæ sphaeræ per medietatem Septentrionalem F. G. Libra per meridionalem inædit, qui motus secundum seriem signorum fit. At per medietatem G. H. L. contra ordinem signorum retroædit, quibus utique motibus Cancer & Capricornus octavæ sphaeræ à Cancro & Capricorno nonæ recedunt uel accedunt alias præcedendo alias uerò sequendo. Sed & poli octavæ sphaeræ hoc motu contraiecti figuras conoidales describunt ut. S. E. E. T.

Textus.

ACCOMMODATIO PRAE-
cedentium hypotheseum
ad Phænomena.

PRIMUM DE MUTATIO-

ne æquinoctiorum pariter & solstitio-
rum, quæ caussa est uariæ
quantitatis anni.

Contingit itaque ut ecliptica octauæ sphaeræ sub di-
uersa eius habitudine successiue in diuersis suis partibus
æquinoctialem primi mobilis intersecet, atq; intersectio
talis nunc in ipso capite arietis primi mobilis accadat,
nunc citra, nunc ultra, ita ut in tempore, quo centrum
parui circuli reuolutionem unam perficit (quæ in qua-
draginta nouem millibus annorum contingit loquendo
naturaliter) quilibet punctus eclipticæ octauæ sphaeræ
æquinoctialem prope caput Arietis, atque etiam prope
caput Libræ primi mobilis secuerit, quæ quidē sectiones
in æquinoctiali accedere quandoque ad capita arietis &
libræ primi mobilis, quandoque autem ab ijsdem remo-
ueri uidentur, aliquando quoque secundum, aliquando
contra successionem signorum progrediendo.

II. DE MUTATIONE DE-

clinationum Solis maximarum.

Vnde fit, ut maximæ zodiaci declinationes varia-
biles existant. Hinc itaque contigisse creditur à diuersis
Astronomis diuersis temporibus earundem maxima-
rum

rum zodiaci declinationum quantitates fuisse nō equaliter inuentas. Maiores nanque repertæ sunt à Ptolemaeo, quàm ab Almeone, quod utique cum similib. uis & modis proæfferint, uix aliter quàm tali motus diuersitate uel simili, sicut dictum est modo, euenire potuit.

REPETITIO SEV EXPLICATIO præcedentium.

Variationem autem sectionis eclipticæ octauæ & æquinoctialis respectu arietis primi mobilis necessariò sequitur, ut æquinoctia similiter & solstitia continuè diuersificentur. Vnde non semper, cum sol in capite arietis primi mobilis fuerit, necesse est æquinoctium accidere, sed stat antea fuisse, uel postea seaturum esse, scilicet cum fuerit in sectione prædicta.

Ex quo nanque sicut supra dictum est, orbes augem solis deferentes super axe eclipticæ octauæ sphæræ ad motum eiusdem sphæræ mouentur, & orbis solem deferens super axe prædicto axi æquidistante, necessariò sequetur, ut centrum corporis solaris semper in superfacie eclipticæ octauæ sphæræ reperiatur. Hæc autem superficies sæpe, imò frequenter est extra caput arietis primi mobilis. Quare sequitur illatum. Similis de uariatione solstitiorum est ratio.

Ex quibus quidem primò concluditur non esse necessarium existentē solem in capite arietis uel libræ primi mobilis nullā habere declinationem ab æquinoctiali.

Secundò,

Secundò, similiter non esse necessarium in capite
 cancri uel Capricorni primi mobilis Solem existentem,
 ab æquinoctiali declinationem habere maximam. Stat
 enim Solem esse in circulo per polos eclipticæ primi
 mobilis & caput Arietis eiusdem transeunte, & tamen
 esse extra superficiem æquinoctialis. Similiter stat eū
 esse in circulo per polos zodiaci primi mobilis & ca-
 put Cancrī eiusdem eunte, & tamen tunc ab æquinocti-
 ali declinationem non habere maximam, sed antea in i-
 psa fuisse uel post in ea fuisse futurum.

Hinc etiam sequitur tropicos Cancrī & Capricorni
 continuè respectu æquinoctialis uariari, nunc quidem
 uersus eum propinquando, nunc ab eo elongando, certos
 tamen limites, quos exire non potest, habet illa uaria-
 tio.


DE TERTIO PHAENOMENO,

*nempe de inequali progressu stella-
 rum fixarum.*

Theo-

THEORICA VARIATIONIS

*sectionum eclipticae mobilis cum aequi-
noctiali, & declinationum.*



Scholia.

Hoc exemplum pictum requirit figurationem so-
lidam.

Textus

Textus.

Ex his autem stellarum motib. satis apertum est motum aggregatum ex motibus nonæ & trepidatione octauæ, quandoque secundum successione, nunc quidem ueloater, nunc tardè, quandoque autem stationarium, & quandoque contra successione contingere secundum diuersum situm capitis arietis octauæ sphaeræ in circumferentia sui parui circuli.

Difficile igitur ualde fuit huius motus antiquis reperire qualitatem, unde diuersi diuersimodè in hoc fuerunt imaginati. Aliqui nanq; dicebant auges & stellas fixas moueri per noningentos annos uersus orientem continuè usq; ad gradus septē. Deinde per alios noningētos annos tantundem e conuerso uersus occidentem.

Albategni uerò dicebat eas moueri uno gradu in sexaginta annis & quatuor mētib. semper uersus orientem.


Alphraganus autem putauit, quod in centum annis unum gradum semper uersus orientem perficerent.

Medius itaq; motus accessus & recessus octauæ sphaeræ, est arcus circuli parui à pūcto supremo quartæ secundum successione signorum usq; ad caput arietis octauæ sphaeræ computatus.

Aequatio autem octauæ sphaeræ, est arcus eclipticæ nonæ sphaeræ, centrum parui circuli & circuli magni à polis eclipticæ nonæ per caput arietis octauæ transeuntem interiacens.

Cum igitur medius motus accessus & recessus nihil fuerit, aut semicirculus, nulla fit dicta æquatio, sed si nonaginta

maginta gradus, aut ducenti septuaginta fuerit, ipsa erit maxima. Cum autē talis motus accessus & recessus fuerit semicirculo minor, æquatio erit semper addenda, sed cū maior fuerit, erit minuenda.



Scholia.

Ecliptica primi mobilis. A. B. I.

Principium Arietis eiusdem. A.

Principiū Arietis nonæ, centrum parui circuli. B.

Ordo signorum ex. A. per. B. ad. L.

Circulus

Circulus quem Aries octauæ sphaeræ circa Arietem nonæ describit. D. K. E. I. in quo D. punctum Borealiſſimum.

Medius motus augium & stellarum fixarum arcus eclipticæ. A. B.

Medius motus accessus & recessus ariete octauæ sphaeræ in puncto F. constituto, est arcus parui circuli D. F.

Aequatio motus accessus & recessus arcus eclipticæ B. H. hæc semper addenda est, dum motus accessus & nondum sex signa habet, quod si sex signa uel amplius habuerit, ipsa iam æquatio ueniet subtrahenda à medio motu augiũ & stellarum fixarum, ut hinc emergat uerus.

THEORICA OCTAVÆ sphaeræ secundum Thebith.

DE NUMERO ECLIPTICA- rum, deq; situ & quantitate circellorum.

Thebith uerò duplicem tantum octauæ sphaeræ motum inesse dixit. Vnum à primo mobili, siue sphaera nona diurnum scilicet: alium uerò proprium, scilicet trepidationis, qui fit super circulis paruis. Duplicem eclipticam asseruit fixam quidem in nona sphaera, mobilem autem in octaua, ita ut capita Arietis & Libræ mobilis circumferantur in duob. circulis paruis, quorum media seu poli sunt ipsa capitis Arietis & Libræ eclipticæ fixæ
 & arcus

Et arcus eclipticæ fixæ inter polos horum parvorum
circularum et circumferentias suas 4. grad. habet. 18.
minut. 43 se. unda.

DESCRIPTIO MOTVS.

Dixit autē capta arietis et libræ mobilia taliter cir-
cunferri, ut cū caput arietis mobilis fuerit in sectione
parui circuli, et æquatoris occidentali, ipsum mouebitur
in medietatem parui circuli, quæ ab æquatore Septen-
trionalis est, caput autem Libræ mobilis mouetur tunc
per medietatem sui parui circuli, quæ meridiana est ab
æquatore, et cū caput arietis mobilis fuerit in sectio-
ne æquatoris et sui parui circuli orientali, mouebitur in
medietatem parui circuli, quæ ab æquatore est meridia-
na. Caput autem Libræ mobilis uoluetur tunc per me-
dietatem sui parui circuli septentrionalē ab æquatore.

DE SYNODO ECLIPTICARVM.

At cū caput Arietis mobilis fuerit in alterutro duo-
rum punctorum sectionis eclipticæ fixæ cum paruo ar-
culo, statuetur ecliptica mobilis directè in superfacie ec-
lipticæ fixæ, quod in una reuolutione capitis arietis
mobilis in suo circulo paruo bis accidet.

DE SECTIONE ECLIPTICARVM.

In omnibus autem alijs locis capite arietis mobilis in
peripheria sui parui circuli locato, ecliptica mobilis se-
cabit eclipticam fixam in punctis quidem capitum Cā-
cri et Capricorni mobilium. Nam hæc duo puncta ecli-
pticæ mobilis semper circumferentiæ eclipticæ fixæ in
hoc motu coherent, ut nusq̃ ab ea readant. A capitibus

tamen Cancrī & Capricornī fixorum per quantitatem 4. graduum. 18. minutorum 43. secundorum elongari uersus orientem aut occidentem contingit.


Vbicunq; etiam sectio harum eclipticarū fiat, ipsam necesse est à principijs arietis & libræ mobiliū per quartam circuli magni distare. Licet uerò in una reuolutione capitis arietis mobilis in suo circulo paruo bis accidat, ut capita Cancrī & Capricornī mobiliū statuatur sub capitib. Cancrī & Capricornī fixorum, nunquā tamē capita arietis & libræ mobilium sub capita arietis & libræ fixorum peruenient. Nam dum ecliptica mobilis continget circulū parū à parte Septentrionis in puncto arietis mobilis, capita Cancrī & Capricornī mobilia iuncta sunt cum capitibus fixorum. Similiter accidit in contactu meridiano, sed capita arietis & libræ semper à capitib. fixorum quantitate, quæ dicta est, distant.

I. DE VARIATIONE PVN- ctorum æquinoctialium.

Ecliptica etiam fixa semper secatur æquatorē in capitib. arietis & libræ fixorū ad angulū semper eūdem, puta 23. graduum 33. minutorum & 30. secundorum. Sed ecliptica mobilis æquatorē successiue secatur in singulis punctis comprehensis in duob. arcibus, quos ecliptica mobilis in duobus sitibus contactum ab æquatore separat, & quantitas cuiusq; est circiter 21. gradus & 30. minuta. Est enim maxima distantia capitis arietis mobilis à sectione eclipticæ cum æquatore per gradus. 10. & 45. minuta.

Schema

SCHEMA MOTVS SECTION-
num uage eclipticæ & æquatoris.



Scholia.

Ecliptica fixa **A. I. K. D.** paruos circulos circa **A.** & **D.** descriptos habens.

Circulus crassior æquator. Reliqui duo circuli puncta opposita paruorum circulorum tangentes eclipticæ mobilis a fixa ecliptica maximos recessus figurant.

Ecliptica octauæ in.N. septentrionalissimo puncto æquinoctium fiet in E. autūnale uerò in C. Sed si australissimum parui arculi punctum aries octauæ occupet, erit æquinoctium uernum in.B. & autumnale in.F.

Textus.

DE ALTERO PHAENOMENO,
nempe de mutatione declinationum maximarum.

Vnde maxima declinatio eclipticæ mobilis ab æquatore variabilis est, maior quandoque declinatione eclipticæ fixæ, quandoque minor eadem, quandoque sibi æqualis, tunc enim æqualis est illi, cum mobilis sub fixæ superfacie fuerit, maior uerò in sitibus contactuum, unde eam Ptolemæus. 23 graduum. 51. minutorum & 20. secundorum reperit. Minor autem, dū caput arietis mobilis in sectione æquatoris & parui arculi fuerit. Nam tunc intersectio eclipticarum erit in puncto eclipticæ mobilis maximè declinante, qui minus declinat, quàm caput Cancris & Capricorni fixum.

Æquatio itaque octauæ sphaeræ, est arcus eclipticæ mobilis, inter caput arietis mobilis & intersectionem eiusdem eclipticæ cum æquinoctiali interceptus.

Sed motus accessus & recessus est arcus circuli parui inter caput arietis mobilis & intersectionem æquatoris, & arculi parui per medietatem circuli septentrionalem progrediendo.

DE

DE TERTIO PHAENOMENO,

id est, inaequali motu stellarum fixarum.

Hoc motu contingit, ut stellæ fixæ uideantur nunc moveri uersus orientem, nunc uersus occidentem, nunc motu ueloci, nunc motu tardo. Nam cū fuerit caput arietis mobilis in quartis parui circuli ab æquatore, uidelicet prope situs contactuum, de quibus diximus, tardē uidentur moveri uersus eam partem, uersus quam est motus earum, quod tunc æquatio octauæ sphaeræ parū crescat aut decrescat. Sed cū fuerit caput arietis mobilis in alterutra sectionum æquatoris & circuli parui uel prope, uelociter moveri uidebuntur stellæ ad eam partem, ad quam est motus earum, quod sub eisdem sitibus æquatio octauæ sphaeræ plurimum crescat aut decrescat. Hinc diuersitas manifesta in motu earum inuenta est. Ptolemæus enim earum loca tempore suo uerificata, comparauit ad loca earū ab Hipparcho & alijs inuenta, reperitq; motas motu tardo, uidelicet in. 100. annis gradu uno. Nam tunc caput arietis erat separatum à puncto quartæ circuli parui meridiane uersus æquatorem accedens, posteriores uerò, dum magis accederet, inueniunt moveri in. 66. annis uno gradu. Nūc nostro tēpore, scilicet anno domini. 1460. factum est caput arietis septentrionale ferē. 66. grad. à sectione parui circuli & æquatoris distans. Vnde & à sectione eclipticæ mobilis cum æquatore 9. gra. 48. minutis ferē distat. Sectio igitur iam sit super 20. gradu. 12. minut. piscium eclipti-

ce mobilis.

Maxima autem æquatio octauæ sphaeræ contingit, dum caput arietis mobilis fuerit super punctis quartæ circuli parui ab intersectionib. eius cum æquatore distinguētib. & est .10. graduum. 45. minut. Vnde quilibet punctus à .19. gradibus. 15. minutis piscium usque ad 10. gradus. 45. minuta arietis eclipticæ mobilis, potest fieri in loco intersectionis, quæ est punctus æqualitatis uernalis, idem intelligendum de puncto æqualitatis autumnalis in arcu opposito. Constat etiam puncta tropica non semper esse in capite Cancræ aut Capricorni mobilis, sed in punctis per quartam à sectione æquatoris cū ecliptica mobili distantibus.

REPETITIO PRAECEDENTium & declaratio.

Ptolemæus itaque iudicans stellas tempore suo moueri ab occidente in orientem, credidit unum tantum esse zodiacum fixum, scilicet, qui semper eandem haberet declinationem ab æquatore, ad quod sequitur id quod dixit. Nam ex quo stellæ meridionales à tropico hyemali recedentes, accedebant uersus punctum æqualitatis uernalis, & existentes inter hoc punctum & tropicum æstiuum in partem septentrionis recedebant ab æquatore, iudicauit moueri secundum successiōem signorum. Sed supposito hoc motu tempore suo in rei ueritate mouebantur contra successiōem signorum eclipticæ fixæ.

Verūm

Verum est tamē, quòd propter æquationē octavæ sphæ-
ræ tunc decreſcentem moveri viſæ ſunt ad ſucceſſionem
ſignorum, quòd in interſectione eclipticæ mobilis cum
æquatore putabat eſſe caput arietis zodiaci immobilis,
quam interſectionem ſemper fixam exiſtimabat.

DE QVARTO PHAENO-
meno, uidelicet motu apogiorum.

Hunc motum ſequuntur omnes ſphærae inferiores in
motibus ſuis, ita ut reſpectu eius eclipticæ mobilis ſint
auges deferentium & declinationes earum
ſemper inuariabiles.

FINIS.



Verum est tamen, quod propter editionis officium sphae-
re tunc deorsum moveri in se hinc ad latitudinem
signatur, quod in intersectione eclipticae mobilis cum
equatore putabit esse caput arietis: quodiam immobilis
quasi intersectionem semper hanc exhibebat.

DE QVARTO PHAEN-

meno, videlicet motu apogeorum.

Hunc motum sequuntur omnes sphaere inferiores in
motibus suis, ita ut eclipticae mobilis sine
magis affectu

